Бебидропс Лактаза может быть рекомендовано в качестве диетической добавки для включения в рацион питания детей от рождения как дополнительный источник фермента лактазы при невосприимчивости к молоку, которая обусловлена дефицитом лактазы, которая расщепляет молочный сахар (Лактозу) (при кормлении младенцев с момента рождения до 4 месяцев), или с целью улучшения функционального состояния желудочно-кишечного тракта (устранение жалоб на вздутие, проявления диспепсии (урчание), понос, кишечные колики), или при непереносимости лактозы (молочного сахара), или другими причинами (Заглатывание воздуха малышом во время кормления, потребление матерью некоторых видов пищевых продуктов, которые могут спровоцировать возникновение кишечных колик).

Лактоза (молочный сахар) - это природный сахар, который содержится во многих пищевых продуктах, наиболее распространенные из которых: молоко (грудное, коровье, козье) и молочные продукты (йогурты, кефиры, творожки, некоторые молочные смеси и каши), а также другие продукты питания.

Непереносимость лактозы (молочного сахара) является пищевой непереносимостью, то есть, когда лактоза (молочный сахар), потребляемая с пищевыми продуктами, не усваивается или усваивается только частично. причиной этого является снижен или отсутствует выработка в организме фермента лактаза, который обычно образуется в тонком кишечнике. Данный пищеварительный фермент расщепляет лактозу в процессе пищеварения на два моносахариды - галактозу и глюкозу (виноградный сахар). Если этого не происходит, то лактоза в неизмененном виде попадает в толстого кишечника и сбраживается кишечными бактериями, в результате чего образуются метан и углекислый газ, которые вызывают вздутие, урчание в животе, понос, кишечные колики. Лактаза, которая содержится в БЕБИДРОПС лактазы, берет на себя функцию лактазы, которая должна вырабатываться в организме, и полноценно выполняет ее функции. Таким образом, если есть проблемы с перевариванием лактозы, лактаза улучшает ее усвоение и устраняет побочные реакции, возникающие при вышеупомянутых нарушениях функционального состояния.

Состав

Лактаза, калия хлорид (стабилизатор Е508), глицерин (эмульгатор Е422), вода. Без ГМО. Нейтральный вкус. Без ароматизаторов, красителей и консервантов. Не содержит сахара.

Способ потребления и рекомендованная суточная доза

При грудном вскармливании: следуя таблице дозировки, накапать соответствующее количество капель БЕБИДРОПС лактазы на предварительно стерилизованную ложку и давать младенцу перед

каждым кормлением. Продолжать грудное вскармливание в обычном режиме.

При кормлении молочными смесями: следуя таблице дозировки, добавить капли БЕБИДРОПС Лактазы в молоко или пищевой смеси.

При потребление матерью некоторых видов пищевых продуктов, которые могут спровоцировать возникновение кишечных колик, а также при непереносимости лактозы (молочного сахара) у взрослых следуя таблице дозировки.

Предостережение

Перед применением обязательна консультация врача.