

Склад

Рекомендована добова доза (5 ml (мл)) містить: сухий дріжджовий ферментат *Saccharomyces cerevisiae* (EpiCor®) – 90 mg (мг), вітамін С – 25 mg (мг), цинк (Zn) – 2,5 mg (мг), вітамін D₃ – 5 µg (мкг).

Вода, цукор, сухий дріжджовий ферментат *Saccharomyces cerevisiae* (EpiCor®), аскорбінова кислота NUTRA-C™ (вітамін С), ароматизатор «лісові ягоди», глюконат цинку (Zinc gluconate), загущувач (ксантанова камідь), консервант (калію сорбат), холекальциферол (вітамін D₃). Без ГМО.

Рекомендації щодо застосування

Бівел™ може бути використаний як додаткове джерело природних поживних речовин для підтримки функціонування захисної системи організму.

Завдяки унікальному поєднанню вітамінів С і D₃, цинку та сухого ферментату з дріжджів EpiCor®, Бівел™ сприяє підвищенню опірності і забезпечує енергетичну підтримку організму під час сезонних застудних захворювань, сприяє укріпленню імунітету та захисту клітин від оксидативного стресу.

До того ж, сухий ферментат з дріжджів EpiCor® підтримує клітинний метаболізм та корисний для збереження здорового стану слизових оболонок під час шкідливого впливу різних алергенів.

Таким чином Бівел™ може бути рекомендований до використання з метою підтримки імунної системи:

для підвищення опірності організму при застудах;

для полегшення і зменшення проявів алергії (чхання, сльозотеча, набряк слизової носа і очей).

Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування та дози

Дітям з 3-х років вживати по 5 ml (мл) суспензії 1 раз на добу. Тривалість споживання – 24 дні або так як призначив лікар.

Перед кожним вживанням пляшку необхідно збовтати.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Застереження

Не вживати при підвищеній чутливості до компонентів, що входять до складу продукту. Не слід вживати дітям до 3-х років, жінкам під час вагітності та грудного вигодовування. Містить цукор, обережністю використовувати у хворих на цукровий діабет.

Перед споживанням обов'язкова консультація з лікарем.

Не є лікарським засобом

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Термін придатності після першого відкриття пляшки становить 30 днів, пляшку треба тримати щільно закритою. Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці або у разі порушення її цілісності.

Форма випуску

Суспензія для внутрішнього застосування по 120 ml (мл) у скляній пляшці разом з мірним стаканчиком у коробці з картону.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 15 °С до 25 °С.