

Склад

Lactobacillus acidophilus, *Saccharomyces bouladaii*, *Bifidobacterium infantis*, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium long*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus lactis* не менше ніж $5,0 \times 10^9$ КУО/г;

допоміжні речовини: діоксид кремнію, фрукто-олігосахариди.

Без ГМО.

Рекомендації щодо застосування

Гостра та хронічна бактеріальна діарея у дітей та дорослих;

дисбактеріоз кишечника з такими симптомами як нудота, блювання, болі в животі, метеоризм, діарея, закреп;

профілактика дисбактеріозів різної етіології, в тому числі з пригніченням імунної системи;

гостра діарея вірусної етіології;

профілактика колітів, зумовлених антибіотикотерапією;

псевдомембранозний коліт, зумовлений *Clostridium difficile*; дисбіоз кишечника;

синдром подразненого товстого кишечника;

нормалізація порушень кишкової мікрофлори, що виникає у разі проживання в несприятливих екологічних умовах, під час подорожей, при дієті.

Спосіб застосування

Внутрішньо, за 20-30 хвилин до прийому їжі. Діти віком від 6 до 12 років: 1 капсула 1 раз на добу; діти старше 12 років та дорослі: 1 капсула 2 рази на добу (вранці та ввечері).

Тривалість застосування становить від двох тижнів до одного місяця або індивідуально, за призначенням лікаря.

Особливості застосування

Не приймати одночасно з дуже гарячою або холодною їжею чи напоями, щоб не знизити активність компонентів.

Не перевищувати зазначену рекомендовану дозу для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінному раціону харчування.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 4 до 24°C в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.