

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**для медицинского применения препарата**  
**АБРОЛ**  
**(ABROL®)**

**Состав лекарственного препарата:**

*действующее вещество:* амброксол;

1 таблетка содержит амброксола гидрохлорида 30 мг;

*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

**Лекарственная форма.** Таблетки.

Круглые, белые таблетки с разделительной риской с одной стороны.

**Название и местонахождение производителя.**

ООО «КУСУМ ФАРМ».

Украина, 40022, г. Сумы, ул. Скрыбина, 54.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Муколитические средства. Код АТС R05C B06.

*Фармакологические свойства.* Амброксол увеличивает секрецию дыхательных путей, усиливает выделение легочного сурфактанта и стимулирует цилиарную активность. Это приводит к улучшению выделения слизи и ее выведения (мукоцилиарный клиренс). Активация секреции жидкости и увеличение мукоцилиарного клиренса облегчают выведение слизи и уменьшают кашель.

Всасывание всех пероральных форм амброксола быстрое и полное, с линейной зависимостью в терапевтическом диапазоне. Максимальные уровни в плазме достигаются через 0,5 - 3 ч. В плазме в терапевтическом диапазоне приблизительно 90 % препарата связывается с протеинами.

При внутреннем приеме распределение амброксола из крови в ткани быстрое и резко выраженное, с высокой концентрацией активного вещества в легких.

Период полувыведения из плазмы составляет 7 - 12 ч; кумуляция не выявлена. При пероральном применении почти 30 % препарата экскретируется с калом. Амброксол метаболизируется, в основном, в печени путем конъюгации. Общая ренальная экскреция составляет приблизительно 90%.

**Показания к применению.**

Муколитическая терапия при острых и хронических бронхопульмональных заболеваниях, связанных с нарушением бронхиальной секреции и ослаблением продвижения слизи.

**Противопоказания.**

Гиперчувствительность к амброксолу или другим компонентам препарата.

**Особые предупреждения.**

***Применение в период беременности или кормления грудью.***

Не рекомендуется применять препарат в период беременности, особенно в I триместре.

Амброксол проникает в грудное молоко, поэтому во время лечения препаратом Аброл следует прекратить кормление грудью.

***Способность влиять на скорость реакций при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.***

Нет данных относительно негативного влияния препарата на скорость психомоторных реакций.

### **Дети.**

Применение амброксола детям в возрасте до 12 лет не рекомендуется в данной лекарственной форме.

### **Способ применения и дозы.**

Для достижения успешного лечения рекомендуется следующий режим приема препарата Аброл.

*Взрослые и дети старше 12 лет:* по 1 таблетке 3 раза в день.

Терапевтический эффект может быть достигнут при применении 2 таблеток 2 раза в день.

Таблетки следует принимать после еды и запивать водой. Длительность лечения – от 4 до 14 суток, в зависимости от течения заболевания.

### **Передозировка.**

На сегодняшний день нет сообщений относительно симптомов передозировки у людей. В случае превышения терапевтической дозы необходимо симптоматическое лечение.

### **Побочные эффекты.**

Как правило, препарат Аброл хорошо переносится больными. Но иногда могут возникать побочные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диспепсия; изредка наблюдаются аллергические реакции в виде кожных высыпаний.

Есть сведения об единичных случаях очень острых анафилактических реакций, однако их связь с приемом амброксола не доказана.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

Применение препарата Аброл вместе с антибиотиками (амоксциллин, цефуроксим, эритромицин, доксициклин) приводит к образованию высоких концентраций антибиотиков в тканях легких.

Нет сообщений относительно клинически нежелательных взаимодействий с другими лекарственными препаратами. Не рекомендуется одновременное применение с лекарственными средствами, имеющими противокашлевую активность (например, кодеинсодержащие противокашлевые препараты).

### **Срок годности.**

3 года.

### **Условия хранения.**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка.**

По 10 таблеток в блистере; по 2 блистера в упаковке.

### **Категория отпуска.**

Без рецепта.