

Адаптол

Состав

Действующее вещество Адаптола - мебикар

Форма выпуска

- таблетки по 300 мг, 500 мг №20 (10x2);
- капсулы по 300 мг №20 (10x2).

Фармакологические свойства

Адаптол имеет умеренную транквилизирующую (анксиолитическую) активность снимает или ослабляет чувство беспокойства, тревожность, страх, внутреннее эмоциональное напряжение и раздражение. Препарат не влияет на координации движений, не снижает умственную и двигательную активность, поэтому его можно применять в течение рабочего дня или во время обучения.

Лекарство относят к дневным транквилизаторам, так как оно не создает приподнятое настроения, ощущения эйфории. Снотворного эффекта не оказывает, но усиливает действие снотворных средств и улучшает сон при его нарушении.

Адаптол оказывает ноотропное действие. Препарат улучшает когнитивные функции, повышает внимание и умственную работоспособность, не стимулируя симптоматику продуктивных психопатологических расстройств, таких как бред, патологическая эмоциональная активность.

Адаптол обладает антиоксидантной активностью, поэтому действует как мембраностабилизатор, адаптогены и церебропротекторы при оксидантном стрессе различного генеза.

Адаптол облегчает никотиновую абstinенцию.

Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 30 минут, высокий уровень сохраняется в течение 3-4 часов, затем постепенно снижается. Препарат полностью выводится из организма с мочой в течение суток, не накапливается и не подлежит биохимическим превращениям в организме.

Показания

- неврозы и неврозоподобные состояния, сопровождающиеся раздражительностью, эмоциональной лабильностью, чувством тревоги и страха;

- для улучшения переносимости нейролептиков или транквилизаторов с целью устранения вызванных ими соматовегетативных и неврологических побочных эффектов;
- кардиалгии различного генеза (не связанные с ИБС);
- для облегчения течения соматовегетативных проявлений при предменструальном синдроме и менопаузе;
- при эмоциональном и оксидативном стрессе различного генеза;
- в составе комплексной терапии никотиновой зависимости как средство, уменьшающее тягу к курению.

Способ применения и дозы

Взрослые принимают по 300–500 мг 2-3 раза в сутки, независимо от приема пищи. Максимальная разовая доза- 3 г, максимальная суточная доза- 10 г.

Продолжительность курса лечения - от нескольких дней до 2-3 месяцев.

Для лечения никотиновой зависимости: по 500-1000 мг 3 раза в сутки ежедневно в течение 5-6 недель.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к мебикару или любому другому из вспомогательных веществ препарата.
- Период беременности и кормления грудью.
- Отсутствует опыт применения у детей.
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия
- Адаптол можно комбинировать с нейролептиками, транквилизаторами (бензодиазепинами), снотворными, антидепрессантами и психостимуляторами.

Особенности по применению

Следует с осторожностью применять больным с артериальной гипотензией, при нарушениях функции печени и почек.

Дети

Препарат не предназначен для применения у детей.

Применение в период беременности или кормления грудью

Адаптол обладает способностью проникать абсолютно во все ткани и жидкости нашего организма. В связи с отсутствием данных относительно безопасности его применения во время беременности либо кормления грудью, не рекомендуется его использовать данной категорией людей.

Передозировка

Адаптол относиться к малотоксичным препаратам.

При значительной передозировке возможно усиление побочных эффектов (аллергические реакции, диспепсические расстройства, слабость, временное снижение артериального давления и температуры тела).

Лечение : необходимо провести промывание желудка и применить общепринятые методы дезинтоксикации.

Побочные эффекты

Адаптол переносится организмом хорошо, но в отдельных случаях возможны побочные эффекты от приема препарата со стороны:

- сердечно-сосудистой системы - снижение артериального давления;
- пищеварительной системы - диспептические расстройства (изжога, тошнота, боли в области живота);
- дыхательной системы - бронхоспазм (резкое сужение бронхов) ;
- кожи, подкожной клетчатки - аллергические реакции (высыпания, зуд, краснота, ангионевротический отек).
- общие нарушения - снижение температуры тела, слабость, головокружение.

Условия хранения

При температуре не выше 25 оС.

Категория отпуска

Без рецепта.

Інструкція препарату Адаптол представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Адаптолу з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш лікуючий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!