

# Агепта

## **Склад**

1 таблетка містить: основні речовини: 400 мг адеметіоніну, що відповідає катіону адеметіоніну 200 мг;

*допоміжні речовини:* підсолоджувачі: манітол, ксилітол, сукралоза, ацесульфам К, неогесперидин; ароматизатор: лайм, екстракт цитрусових; регулятор кислотності: лимонна кислота; жирні кислоти, оксид магнію, діоксид кремнію, целюлоза мікрокристалічна.

## **Показання**

Рекомендується як додаткове джерело адеметіоніну для відновлення функції печінки при порушенні харчування, вживанні алкоголю або внаслідок шкідливого впливу чинників довкілля.

Сублінгвальна форма, при якій таблетка розчиняється під язиком, забезпечує основній речовині можливість легше потрапити в кровотік, минаючи стравохід і шлунок.

## **Протипоказання**

Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність і період лактації, біполярний психоз.

## **Спосіб застосування та рекомендовані дози:**

Таблетку слід виймати з блістера безпосередньо перед прийомом. Приймати дорослим по одній таблетці 2 рази на добу за 30-60 хвилин до прийому їжі, утримуючи під язиком не менше 15-20 хвилин – до повного розчинення.

Тривалість курсового прийому – один місяць, якщо лікар не призначив інакше. За необхідності курс можна повторити.

Перед початком застосування рекомендована консультація лікаря.

## **Застереження щодо застосування**

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Прийом АГЕПТА перед сном, в тому числі на ніч, – небажаний, зважаючи на супутній тонізуючий ефект адеметіоніну.

При прийомі антидепресантів або інгібіторів моноаміноксидази проконсультуйтеся з лікарем про можливість застосування АГЕПТА.

**Форма випуску**

таблетки сублінгвальні №20 (5 блістерів по 4 таблетки) в картонній пачці.

**Умови зберігання**

Строк придатності: 2 роки від дати виробництва.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°C до 25°C у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Інструкція препарату Агепта представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Агепта з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш лікуючий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!