

# Аквадетрим вітамін D3

## **Опис.**

Вітамін D3 - це препарат з активним антирахітичним фактором. Найважливішою функцією вітаміну D є регулювання метаболізму кальцію та фосфатів, що сприяє правильній мінералізації і росту скелета.

Вітамін D3 швидко і повністю всмоктується в шлунково-кишковому тракті, виводиться з сечею і калом. Після прийому вітаміну D 3 вже через 48 годин спостерігається значне підвищення рівня холекальциферолу в сироватці крові.

## **Форма випуску.**

Краплі для прийому всередину 15000 МО / мл по 10 мл у флаконі темного скла з дозатором.

## **Склад.**

Діюча речовина Аквадетрима - холекальциферол (вітамін D3).

## **Показання.**

- профілактика і лікування дефіциту вітаміну D 3;
- профілактика і лікування рахіту, гіпокальціємічні тетанії, остеомаляції, мальабсорбції;
- комплексне лікування остеопорозу, гіпопаратиреоза.

## **Спосіб застосування та дози.**

Тривалість лікування залежить від перебігу та тяжкості захворювання і визначається лікарем індивідуально.

**Діти:** з 4-го тижня життя - до 2-3 років по 1 краплі на добу при правильному догляді і достатньому перебування на свіжому повітрі.

Недоношені діти, близнюки, немовлята, що знаходяться в поганих життєвих умовах: з 4-го тижня життя по 2-3 краплі на добу.

**Дорослі:** пацієнти без порушень всмоктування: 500 МЕ (1 крапля) в день.

**Пацієнти при синдромі мальабсорбції:** 3000-5000 МЕ (6-10 крапель) в день.

**Вагітні жінки:** щоденна доза 1 крапля вітаміну D3 на добу.

## **Особливості по застосуванню.**

З обережністю слід приймати пацієнтам з порушеною функцією нирок, серцево-судинними захворюваннями.

Аквадетрим не рекомендується приймати одночасно з тіазидами, серцевими глікозидами, антацидами (в яких міститься алюміній або магній), кетоконазолом, препаратами, що містять високі дози кальцію або фосфору, препаратами для зниження маси тіла (орлістат).

### **Протипоказання.**

- підвищена чутливість до діючої речовини або будь-якого іншого з допоміжних речовин препарату;
- саркоїдоз, нефролітіаз, туберкульоз;
- гострі і хронічні захворювання нирок і печінки.

### **Застосування в період вагітності або годування груддю.**

Під час вагітності та в період годування дітей грудьми з обережністю слід приймати препарат, доза вітаміну D3 не повинна перевищувати 600 МО на добу.

### **Побічні ефекти.**

Імовірність розвитку побічних реакцій залежить від дози, тривалості лікування і діляться на наступні категорії:

#### **Рідко виникають:**

- алергічні реакції, включаючи висип, свербіж, кропив'янка, почервоніння шкіри;
- сонливість, запаморочення, депресії, головний біль;
- нудота, блювота, діарея, втрата апетиту;
- аритмія, гіпертензія.

### **Передозування.**

При передозуванні може виникати м'язова слабкість, втрата апетиту, нудота, блювота, запор, сонливість, панкреатит, ринорея, гіпертермія, кон'юнктивіт, артеріальна гіпертензія, серцева аритмія і уремія. Необхідно припинити прийом препарату і звернутися до лікаря.

### **Здатність впливати на швидкість реакцій при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

За умови застосування відповідно до рекомендованих дозами і тривалістю лікування препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

### **Діти.**

Застосовують дітям з другого тижня життя.

### **Умови зберігання.**

При температурі не вище 25 ° С.

### **Категорія відпустки.**

Без рецепта.

**Виробник.**

Медана Фарма Акціонерне Товариство, Польща

Інструкція препарату Аквадетрим вітамін D3 представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Аквадетриму вітаміну D3 з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!