

Анаприлін Здоров'я

Склад.

Діюча речовина анаприліном - пропранололу гідрохлорид.

Форма випуску.

Таблетки 10 мг або 40 мг №50 (10x5), №50 в блістері, №50 в контейнері.

Опис.

Пропранолол - неселективний блокатор бета-блокатори. Знижує частоту і силу серцевих скорочень, зменшує потребу міокарда в кисні, уповільнює AV-провідність. Гіпотензивний ефект стабілізується до кінця 2 тижні курсу лікування.

Показання.

- артеріальна гіпертензія;
- ішемічна хвороба серця;
- есенціальний тремор;
- профілактика мігрені;
- симптоматичне лікування гіпертиреозу.

Спосіб застосування та дози.

Режим дозування визначає лікар. Призначають внутрішньо, запиваючи достатньою кількістю води, за 10-30 хвилин до їжі по 10-20 мг 2-4 рази на добу. Дози поступово підвищують до 40 мг 4-6 разів на добу.

Дітям застосовують з розрахунку 0,25-0,5 мг / кг маси тіла 3-4 рази на добу.

Протипоказання.

- підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого становить препарату;
- кардіогенний шок;
- AV-блокада II-III ступеня;
- брадикардія;
- синоатріальна блокада;
- артеріальна гіпотензія;
- тяжкі порушення периферичного кровообігу;
- стенокардія Принцметала;
- бронхіальна астма;
- метаболічний ацидоз.

Побічні ефекти.

У рекомендованих дозах зазвичай добре переноситься. Можливе виникнення таких побічних реакцій: артеріальна гіпотензія, синусова брадикардія, тромбоцитопенія, лейкопенія, агранулоцитоз, астенія, запаморочення, головний біль, депресія, галюцинації, сухість і болючість очей,

кератокон'юктивіт, фарингіт, кашель, нудота, блювота, діарея, свербіж, висипи, гіпоглікемія, порушення функції печінки, лихоманка, зниження потенції

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.

З обережністю застосовують разом з гіпоглікемічними засобами.

При одночасному застосуванні пропранололу з трициклічними антидепресантами, барбітуратами, анестезуючими засобами, антигіпертензивними і судорасщіряючими препаратами і діуретиками спостерігається зниження артеріального тиску.

При застосуванні анестетиків з пропранололом слід дотримуватися обережності.

При одночасному застосуванні ібупрофену або індометацину з пропранололом може знизити гіпотензивний ефект останнього.

Глікозиди наперстянки при одночасному застосуванні з b-блокаторами можуть підвищувати час AV провідності.

Одночасне застосування циметидину або гидралазіна, а також алкоголю, підвищує рівень пропранололу в плазмі крові.

Слід дотримуватися обережності також при застосуванні з такими препаратами як адреналін, ізопреналін і норадреналін.

Спосіб застосування.

Для пацієнтів з нирковою недостатністю слід збільшити інтервал між прийомом препарату щоб уникнути накопичення препарату.

У пацієнтів з портальною гіпертензією може бути порушена функція печінки і розвинути печінкова енцефалопатія. Застосування пропранололу в таких випадках може підвищити ризик розвитку печінкової енцефалопатії.

При проведенні анестезії на тлі застосування пропранололу потрібна обережність.

Діти.

Призначають дітям з 3 років.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

При виникненні побічних ефектів потрібно відмовитися від керування транспортними засобами або занятті іншими потенційно небезпечними видами діяльності.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Не застосовується

Передозування.

При передозуванні можливі прояви таких симптомів: запаморочення, виражена артеріальна гіпотензія, брадикардія, колапс, судоми, утруднення дихання, бронхоспазм, аритмія, серцева недостатність.

У разі передозування рекомендується промивання шлунка і призначення адсорбуючих засобів.

Термін вживання.

4 роки з моменту виробництва.

Умови зберігання.

При температурі не вище 25 ° С, в недоступному для дітей місці.

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробник.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Інструкція препарату Анаприлін представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Анаприліну з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!