

Ангилекс Здоровье

Состав.

Действующие вещества Ангилекса – гексетидин, хлорбутанола гемигидрат, холина салицилат.

Фармакологические свойства.


Ангилекс – комплексное антисептическое, противогрибковое, противовоспалительное, болеутоляющее средство для местного применения. Антисептическое действие связано с подавлением окислительных реакций метаболизма бактерий. Противогрибковое действие связано с нарушением синтеза клеточной стенки грибов. Противовоспалительное и обезболивающее действие вызвано с ингибированием активности фермента циклооксигеназы ЦОГ 1 и ЦОГ 2, угнетением синтеза простагландинов, останавливает функции макрофагов и нейтрофилов.

Показания.

Взрослым и детям старше 6 лет назначают для лечения воспалительных и инфекционных, а также тяжелых лихорадочных или гнойных заболеваний полости рта и глотки, требующих назначения антибиотиков и сульфаниламидов:

- тонзиллит, ангина;
- фарингит, ларингит;
- гингивит и кровоточивость десен;
- заболевания периодонта и их симптомы;
- стоматит;
- инфицирование лунок зубов после их удаления;
- грибковые инфекции полости рта и глотки (молочница);
- неприятный запах изо рта, в частности при разрушающихся опухлях полости рта и глотки;
- простудные заболевания.

Форма выпуска.

- спрей для ротовой полости по 50 мл во флаконе;  спрей для ротовой полости по 30 мл в баллоне;
- раствор для ротовой полости по 120 мл во флаконе.

Способ применения.

Спрей: взрослым и детям старше 15 лет назначают по 1 орошению 4-6 раз в сутки. Детям от 6-15 лет по 1 орошению 2-3 раза в сутки. Курс лечения 5 дней.

Раствор: взрослым и детям старше 6 лет назначают для полоскания ротовой полости разведенным раствором (2 чайные ложки раствора,

разведенные ¼ стакана теплой воды) от 2-4 раз в сутки. Курс лечения не более 5 дней.

Дети.

Противопоказан детям до 6 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Исследования по использованию препарата у беременных и кормящих не проводились, поэтому Ангилекс не применяется во время беременности и кормления грудью.

Особенности по применению.

При длительном применении может нарушить микрофлору ротовой полости.

Противопоказания.

- повышенная чувствительность к любому составляющему препарата;
- атрофический фарингит;
- бронхиальная астма, пневмония, туберкулез.

Побочные эффекты.

При применении могут возникнуть такие побочные реакции:

- анафилактические реакции;
- раздражение слизистой оболочки рта.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия.

Нельзя применять с другими антисептическими средствами. В случае необходимости препарат следует отменить. Щелочные растворы инактивируют действие препарата.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Препарат содержит этанол, поэтому в течении 30 минут после применения препарат не рекомендуется управлять транспортным средством.

Передозировка.

Может возникнуть алкогольная интоксикация, поскольку в составе препарата присутствует этиловый спирт. В случае передозировки проводят симптоматическое лечение.

Условия хранения.

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания"
Здоровье ", Украина

Инструкция препарата Ангилекс представлена исключительно с ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Ангилекса с целью лечения, его дозировки, схемы лечения, противопоказания и совместимостью с другими медикаментами, может предоставить только ваш лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!