

# Ангілекс Здоров'я

## **Склад.**

Діючі речовини Ангілекса - гексетидин, хлорбутанолу гемігідрат, холіну саліцилат.

## **Фармакологічні властивості.**

Ангілекс - комплексне антисептичну, протигрибкову, протизапальну, болезаспокійливу засіб для місцевого застосування. Антисептичну дію пов'язано з придушенням окислювальних реакцій метаболізму бактерій. Протигрибковий дія пов'язана з порушенням синтезу клітинної стінки грибків. Протизапальну та знеболювальну дію викликано з пригніченням активності ферменту ЦОГ 1 і ЦОГ 2, пригніченням синтезу простагландинів, зупиняє функції макрофагів і нейтрофілів.

## **Показання.**

Дорослим і дітям старше 6 років призначають для лікування запальних і інфекційних, а також важких гарячкових або гнійних захворювань порожнини рота і глотки, що вимагають призначення антибіотиків і сульфаніламідів:

- тонзиліт, ангіна;
- фарингіт, ларингіт;
- гінгівіт і кровоточивість ясен;
- захворювання періодонта і їх симптоми;
- стоматит;
- інфікування лунок зубів після їх видалення;
- грибкові інфекції порожнини рота і глотки (молочниця);
- неприємний запах з рота, зокрема при руйнуються пухлинах порожнини рота і глотки;
- простудні захворювання.

## **Форма випуску.**

- спрей для ротової порожнини по 50 мл у флаконі;
- спрей для ротової порожнини по 30 мл у балоні;
- розчин для ротової порожнини по 120 мл у флаконі.

## **Спосіб застосування.**

**Спрей:** дорослим і дітям старше 15 років призначають по 1 зрошенню 4-6 разів на добу. Дітям від 6-15 років по 1 зрошенню 2-3 рази на добу. Курс лікування 5 днів.

**Розчин:** дорослим і дітям старше 6 років призначають для полоскання ротової порожнини розведеним розчином (2 чайні ложки розчину, розведені ¼ склянки теплої води) від 2-4 разів на добу. Курс лікування не більше 5 днів.

## **Діти.**

Протипоказаний дітям до 6 років.

### **Застосування в період вагітності або годування груддю.**

Дослідження з використання препарату у вагітних і годуючих не проводилися, тому Ангілекс не застосовується під час вагітності та годування груддю.

### **Особливості по застосуванню.**

При тривалому застосуванні може порушити мікрофлору ротової порожнини.

### **Протипоказання.**

- підвищена чутливість до будь-якого складового препарату;
- атрофічний фарингіт;
- бронхіальна астма, пневмонія, туберкульоз.

### **Побічні ефекти.**

При застосуванні можуть виникнути такі побічні реакції:

- анафілактичні реакції;
- подразнення слизової оболонки рота.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.**

Не можна застосовувати з іншими антисептичними засобами. У разі необхідності застосування препарату слід припинити. Лужні розчини інактивують дію препарату.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Препарат містить етанол, тому протягом 30 хвилин після застосування препарату не рекомендується керувати транспортним засобом.

### **Передозування.**

Може виникнути алкогольна інтоксикація, оскільки в складі препарату присутній етиловий спирт. У разі передозування проводять симптоматичне лікування.

### **Умови зберігання.**

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° С.

### **Категорія відпустки.**

Без рецепта.

### **Виробник.**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Інструкція препарату Ангілекс представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Ангілексу з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!

