

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України
01.12.2014 № 905
Реєстраційне посвідчення
№ UA/2616/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
АТОКСІЛ
(ATOXIL)

Склад:

діюча речовина:

- 1 флакон містить 10,0 г кремнію діоксиду (високодисперсного);
- 1 пакет-саше містить 2,0 г кремнію діоксиду (високодисперсного).

Лікарська форма. Порошок.

Основні фізико-хімічні властивості: легкий аморфний порошок білого кольору без смаку та запаху.

Фармакотерапевтична група. Ентеросорбенти. Код ATХ A07B C.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Атоксіл – ентеросорбент з вираженими сорбційними властивостями, проявляє дезінтоксикаційну, протимікробну та ранозагоювальну дію. Адсорбує з травного тракту і виводить з організму ендогенні та екзогенні токсичні речовини різного походження, у тому числі харчові та бактеріальні алергени, мікробні ендотоксини та інші отруйні речовини, токсичні продукти, що утворюються у процесі гниття білків у кишечнику. Сприяє транспортуванню з внутрішнього середовища організму (кров, лімфа, інтерстиція) у травний тракт за рахунок концентраційних та осмотичних градієнтів різних токсичних продуктів, у тому числі середніх молекул, олігопептидів, амінів та інших речовин з подальшим виведенням з організму.

Фармакокінетика.

Препарат практично не всмоктується з кишечнику.

Клінічні характеристики.

Показання.

Гострі кишкові захворювання, що супроводжуються діарейним синдромом (сальмонельоз, харчові токсикоінфекції); у комплексній терапії вірусних гепатитів А і В.

Зовнішньо – лікування гнійних ран, трофічних виразок та опіків.

Протипоказання.

- Підвищена чутливість до кремнію діоксиду;
- виразкова хвороба шлунка та дванадцяталіпалої кишки у стадії загострення;
- виразки та ерозії кишечнику;
- непрохідність кишечнику.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.

При одночасному застосуванні Атоксілу з ацетилсаліциловою кислотою посилювалися процеси дезагрегації тромбоцитів. У комплексній терапії з нікотиновою кислотою і симвастатином Атоксіл проявляє синергічну дію – сприяє зниженню рівня атерогенних фракцій ліпідного детоксикації у поєднанні зі стандартними розчинами антисертиків (фурацилін, біфуран, трифуран, хлоргексидину біглюконат) підвищує ефективність лікування гнійно-запальних захворювань.

Особливості застосування.

Забороняється вживання сухого порошку перорально.

Атоксіл при застосуванні його у комплексній терапії слід приймати за 1 годину до прийому інших пероральних лікарських засобів через їх можливу абсорбцію і відповідно – зниження ефективності.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У зв'язку з відсутністю даних про застосування Атоксілу у період вагітності або годування груддю застосування препарату не рекомендується. Не випливає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Способ застосування та дози.

Атоксіл приймати у вигляді суспензії для внутрішнього застосування. Вміст 1-2 пакетів-саше (2-4 г) ретельно розмішувати у 50-100 мл (1/4-1/2 склянки) нейтральної негазованої або охолодженої кип'ячені води до утворення однорідної суспензії. Флакон з порошком відкрити, для дорослих і дітей віком від 7 років становить 12 г, при необхідності добову дозу можна збільшити до 24 г; для дітей від 1 до 7 років добова доза становить 150-200 мг на 1 кг маси тіла. Добову дозу розподіляти на 3-4 прийоми. Максимальна разова доза не повинна перевищувати половини добової дози. Приготовану водну суспензію препарату приймати внутрішньо за 1 годину до їди або прийому лікарських засобів. 7 г, препарат приймати 2-3 рази на добу. Якщо хворий не може приймати ентеросорбент самостійно, суспензія Атоксілу слід вводити у шлунок через зонд.

При гострих кишкових захворюваннях курс лікування становить 3-5 днів. У тяжких випадках термін лікування може бути продовжений до 10-15 днів.

Курс лікування вірусних гепатитів залежить від тяжкості перебігу захворювання і становить 7-10 днів.

Зовнішнє застосування. Після очищення рані наносити порошок шаром 3-5 мм та закривати сухою асептичною пов'язкою. Перев'язки робити через добу до очищення ран.

Діти.

Препарат не призначати дітям у віці до 1 року.

Передозування.

Про випадки передозування повідомлень не було.

Побічні реакції.

Препарат зазвичай добре переноситься. У поодиноких випадках можливе виникнення запору.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C.

Упаковка.

По 10,0 г порошку у флаконі, по 1 флакону в пачці з картону.

По 2,0 г порошку у пакеті-саше, по 20 пакетів-саше в пачці з картону.

Категорія відпуску.

Без рецепті.

Виробник.

ТОВ «Орісіл-Фарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Заводська, 1Б.