

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України

№ 392

Реєстраційне посвідчення

№ 04/6660/04/01

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ**  
**(за Вишневським)**  
**(LINIMENTUM BALSAMICUM WISHNEVSKY)**

**Загальна характеристика:**

*основні фізико-хімічні властивості:* однорідна мазеподібна маса від світло-жовтого до бурого кольору зі специфічним запахом;

*склад:* 100 г лініменту містять дьогтю березового 3 г, ксероформу 3 г;

*допоміжні речовини:* аеросил, олія рицинова.

**Форма випуску.** Лінімент.

**Фармакотерапевтична група.** Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТС D08A X10\*\*.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Лінімент виявляє слабку дезінфікуючу, в'яжучу, місцеву подразнювальну дію. Внаслідок слабкої подразнювальної дії на рецептори тканин сприяє прискоренню процесу регенерації, нормалізуючи кровообіг у тканинах, підсилюючи процеси ороговіння епідермісу.

*Фармакокінетика.* Не вивчалась.

**Показання для застосування.** Лікування ран, виразок, пролежнів.

**Спосіб застосування та дози.** Лінімент застосовують зовнішньо: наносять на уражені ділянки шкіри. На рани накладають просочену препаратом стерильну серветку або стерильну пов'язку. Тривалість курсу лікування – від 6 до 20 діб.

**Побічна дія.** При тривалому застосуванні можливе подразнення шкіри. Алергічні реакції.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до дьогтю і ксероформу. Дитячий вік.

**Передозування.** Не описане.

**Особливості застосування.** Лінімент призначений тільки для зовнішнього застосування. Перед накладанням пов'язки рану очищають від некротичних тканин, розкривають пухирі, промивають антисептичним розчином. Пов'язку змінюють 1 раз на 2 - 3 дні. Не можна допускати потрапляння лініменту на слизові оболонки. Руки після нанесення лініменту слід ретельно вимити для запобігання потрапляння залишків мазі в очі, ніс, рот.

Оскільки безпека та клінічна ефективність препарату в період вагітності та годування груддю не вивчалась, призначати його слід з урахуванням співвідношення ризик/користь. Вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами та іншими механізмами не описаний.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C; не допускається заморожування.  
Термін придатності – 5 років.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** Контейнери по 25 та 50 г; туби по 40 г.

**Виробник.** ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола".

**Адреса.** Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Заступник директора Державного  
фармакологічного центру  
МОЗ України, д.м.н., професор



В.Г. Лізогуб

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ Министерства  
здравоохранения Украины  
*11.04.04 № 392*  
Регистрационное свидетельство  
№ *ВА/6660/01/01*

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ ЛИНИМЕНТ**  
**(по Вишневскому)**  
**(LINIMENTUM BALSAMICUM WISHNEVSKY)**

**Общая характеристика:**

**основные физико-химические свойства:** однородная мазиобразная масса от светло-желтого до бурого цвета со специфическим запахом;

**состав:** 100 г линимента содержат дегтя березового 3 г, ксероформа 3 г;

**вспомогательные вещества:** аэросил, масло касторовое.

**Форма выпуска.** Линимент.

**Фармакотерапевтическая группа.** Антисептические и дезинфицирующие средства.  
Код АТС D08A X10\*\*.

**Фармакологические свойства.**

**Фармакодинамика.** Линимент проявляет слабое дезинфицирующее, вяжущее, местное раздражающее действие. В результате слабого раздражающего действия на рецепторы тканей, способствует ускорению процесса регенерации, нормализуя кровообращение тканей, усиливает процессы ороговения эпидермиса.

**Фармакокинетика.** Не изучалась.

**Показания к применению.** Лечение ран, язв, пролежней.

**Способ применения и дозы.** Линимент применяют наружно: наносят на пораженные участки кожи. На раны наносят пропитанную препаратом стерильную салфетку или стерильную повязку. Длительность курса лечения – от 6 до 20 суток.

**Побочное действие.** При длительном применении возможно раздражение кожи. Аллергические реакции.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к дегтю и ксероформу. Детский возраст.

**Передозировка.** Не описана.

**Особенности применения.** Линимент предназначен только для наружного применения. Перед наложением повязки рану очищают от некротических тканей, вскрывают волдыри, промывают антисептическим раствором. Повязку меняют 1 раз в 2 - 3 дня. Нельзя допускать попадание линимента на слизистые оболочки. Руки после нанесения линимента тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков мази в глаза, нос, рот. Безопасность и клиническая эффективность препарата в период беременности и кормления грудью не изучалась, поэтому назначать препарат необходимо с учетом соотношения риск/польза. Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не описано.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом.

**Условия и срок хранения.** Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C; не допускается замораживание.

Срок годности – 5 лет.

**Условия отпуска.** Без рецепта.

**Упаковка.** Контейнеры по 25 и 50 г; тубы по 40 г.

**Производитель.** ЗАО Фармацевтическая фабрика "Виола".

**Адрес.** Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Кирова, 75.

Заместитель директора Государственного  
фармакологического центра  
МЗ Украины, д.м.н., профессор



В.Г. Лизогуб