

# Берези бруньки

**Склад:**

Діюча речовина: бруньки берези.

**Лікарська форма:**

Бруньки.

**Основні фізико-хімічні властивості:**

Бруньки подовжено-конічні, загострені або притуплені, часто клейкі. Луски розташовані черепицеподібно, щільно притиснуті з країв, трохи в'їчасті (нижні коротші за верхні та іноді з кінчиками, які трохи відстають); довжина бруньок 3-7 мм, ширина – 1,5-3 мм;

Колір бруньок коричневий, біля основи трохи зеленкуватий. Запах бальзамічний, приємний. Смак трохи в'язучий, смолистий.

**Фармакотерапевтична група:**

Нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю. Код АТХ С03В Х.

**Фармакологічні властивості:**

*Фармакодинаміка.*

Завдяки хімічному складу препарати берези бруньок проявляють помірну жовчогінну, сечогінну, протизапальну та відхаркувальну дію.

**Показання:**

Хронічні запальні захворювання нирок та сечового міхура; сечокам'яна хвороба; набряки серцевого походження; захворювання печінки та жовчовивідних шляхів із порушенням жовчовиділення; ларингіти, бронхіти, трахеїти.

**Протипоказання:**

Ниркова недостатність, гострі запальні захворювання нирок, гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату, наявність в анамнезі кровотеч з органів малого таза; анемія; епілепсія.

**Особливі заходи безпеки:**

Перед початком лікування слід проконсультуватися з лікарем. При появі дизуричних явищ, гарячки, спазмів або крові у сечі слід звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій:**  
Невідома.

**Особливості застосування:**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Безпеку та клінічну ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчали.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не описано.

**Спосіб застосування та дози:**

1 столову ложку бруньок вмістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплом вигляді по  $\frac{1}{3}$  склянки 2-3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди. Діти віком 12-14 років – по  $\frac{1}{4}$  склянки, віком від 14 років – по  $\frac{1}{3}$  склянки 2-3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

*Діти.*

Не призначати дітям віком до 12 років.

**Передозування:**

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

**Побічні реакції:**

Діарея. Можливі прояви подразнювальної дії настою на тканину нирок; алергічні реакції, включаючи свербіж, висипання на шкірі, алергічний риніт, кропив'янку, гіперемію та набряк шкіри. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

**Термін придатності:**

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання:**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; приготовлений настій – у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.

**Упаковка:**

По 10 г у пакетах; по 10 г або 20 г, або 50 г у пакети з вкладанням у пачку.

***Категорія відпуску:***

Без рецепта.

***Виробник:*** Віола, Україна

Інструкція препарату представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні бруньків Берези з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!