

БЕТИОЛ

Состав

Действующее вещество: 1 суппозиторий содержит экстракта красавки густого 15 мг, ихтаммола 200 мг.

Вспомогательное вещество: твёрдый жир.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные.

Фармакотерапевтическая группа

Антигеморроидальные препараты для местного применения.

Код АТС С05А Х03.

Основные физико-химические свойства

Суппозитории темно-бурого цвета с запахом ихтиола, допускается едва заметный налет на поверхности суппозиториев.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Комбинированный препарат для местного лечения геморроя. Обладает болеутоляющим, противовоспалительным и спазмолитическим действием ослабляет спазм мускулатуры кишечника. Экстракт красавки оказывает спазмолитическое действие, уменьшает перистальтику кишечника. Ихтаммол обладает противовоспалительным и местноанестезирующим свойствами.

Показания к применению.

Геморрой и трещины заднего прохода.

Способ применения и дозы.

Взрослые и дети старше 14 лет применяют ректально по 1 суппозиторию 1 - 3 раза в день. При необходимости допускается применять чаще, но не более 10 суппозиториев в сутки. Продолжительность курса лечения определяется характером и тяжестью заболевания, достигнутым терапевтическим эффектом.

Побочное действие.

При повышенной индивидуальной чувствительности к действующим веществам возможны сухость во рту, жажда, запор, ощущение сердцебиения, расширение зрачков. В этих случаях препарат следует отменить.

Противопоказания.

Глаукома, аденома предстательной железы, гиперчувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 14 лет.

Передозировка.

При передозировке возможны сухость во рту, жажда, запор, усиленное сердцебиение, расширение зрачков. При отравлении развивается делирий с психомоторным возбуждением, требующий специальной терапии. Терапия симптоматическая.

Особенности применения.

При лечении препаратом рекомендуется воздерживаться от управления транспортом и выполнения работ, требующих повышенного внимания и точной координации. Женщинам в период беременности или кормления грудью препарат назначают, учитывая соотношение риск/польза.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.

Условия и срок хранения.

В защищённом от света месте при температуре от +8 С до +15 С. Срок годности 2 года.

Условия отпуска.

Без рецепта.

Инструкция препарата Бетиол представлена исключительно с ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Бетиола с целью лечения, его дозировки, схемы лечения, противопоказания и совместимость с другими медикаментами, может предоставить только ваш лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!