

Церукал

Склад

Діюча речовина Церукал - метоклопрамида гідрохлорид

Форма випуску

таблетки по 10 мг №50 у флаконі;

розчин для ін'єкцій 10 мг / 2 мл по 2 мл №10 в ампулах.

Опис

Метоклопрамід - специфічний блокатор дофамінових і серотонінових рецепторів, який має виражену протиблювотну дію при блюванні різного походження. Підвищує тонус шлунка і кишечника, прискорює спорожнення шлунка, стимулює перистальтику кишечника, нормалізує відділення жовчі. Після прийому всередину швидко і повністю всмоктується

Показання

Дорослим призначають для зменшень нападів нудоти і блювоти при:

- хіміотерапії;
- після проведення операцій;
- радіотерапія;
- гостра мігрень.

Дітям застосовують як препарат другої лінії для запобігання нудоти і блювання, спричинених хіміотерапією і після операцій.

Спосіб застосування

Дорослі застосовують по 1 таблетці до 3 разів на добу. Максимальна добова доза - 30 мг або 0,5 мг / кг маси тіла.

Рекомендована доза для дітей становить 0,1-0,15 мг / кг маси тіла до 3 разів на добу. Максимальна добова доза - 0,5 мг / кг маси тіла.

Максимальна тривалість лікування метоклопрамідом - 5 діб.

Приймати всередину перед їжею, запиваючи достатньою кількістю води.

Розчин для ін'єкцій вводиться внутрішньом'язово або повільно внутрішньовенно. Дозування розчину для ін'єкцій, як і в формі таблеток.

Протипоказання

- підвищена чутливість до метоклопраміду або до будь-якого іншого компоненту препарату;
- шлунково-кишкова кровотеча;

- механічна кишкова непрохідність;
- шлунково-кишкова перфорація;
- епілепсія;
- хвороба Паркінсона;
- одночасне застосування з леводопою або допамінергічними агоністами;
- підвищена судомна готовність;
- дискінезія, спричинена нейролептиками або метоклопрамідом, в анамнезі;
- встановлена метгемоглобінемія при застосуванні метоклопраміду;
- підтверджена або запідозрена феохромоцитома;
- ін'єкційний розчин не можна застосовувати хворим на бронхіальну астму з підвищеною чутливістю до сульфідів.

Побічні ефекти

При застосуванні можуть виникнути такі побічні реакції:

- анафілактичні реакції, реакції гіперчутливості;
- метгемоглобінемія, сульфгемоглобінемія;
- брадикардія, артеріальна гіпотензія, тимчасове підвищення артеріального тиску;
- аменорея, гіперлактінемія, галакторея, гінекомастія, порушення менструального циклу;
- нудота, сухість у роті, запор, діарея;
- головний біль, запаморочення, сонливість;
- висип, кропив'янка, ангіоневротичний набряк;
- депресія, галюцинації, сплутаність свідомості;
- астенія, підвищена стомлюваність.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

Леводопу або допамінергічні агоністи і метоклопрамід не можна разом застосовувати.

Не можна застосовувати разом з алкоголем.

Розчин для ін'єкцій не можна змішувати з лужними інфузійними розчинами.

З обережністю призначають разом з: антихолінергічними засобами та похідними морфіну, інгібіторами центральної нервової системи, нейролептиками, серотонінергічними препаратами, дигоксином, циклоспорином, мівакуриєм і суксаметонієм, інгібіторами CYP2D6

Особливості по застосуванню

Таблетки Церукал містять лактозу.

Церукал не слід застосовувати для лікування хронічних захворювань, таких як гастропарез, диспепсія і гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

При застосуванні можуть спостерігатися екстрапірамідні порушення. У разі розвитку екстрапірамідних симптомів метоклопрамід потрібно негайно

скасувати. Ці ефекти після припинення лікування повністю зникають, але можуть вимагати симптоматичного лікування.

Щоб уникнути передозування потрібно дотримуватися 6-годинний інтервал між прийомами.

Протипоказаний дітям до 1 року

Застосування в період вагітності або годування груддю:

Метоклопрамід можна застосовувати під час вагітності (якщо є необхідність), уникаючи застосування на останніх термінах.

Не рекомендується застосовувати метоклопрамід під час годування грудьми.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

При виникненні запаморочення, сонливості, дискінезії і дистонії, які можуть вплинути на зору, потрібно відмовитися від керування транспортними засобами.

Передозування

При застосуванні високих доз препарату можуть виникнути такі симптоми: сонливість, сплутаність свідомості, неспокій, судоми, брадикардія, зниження артеріального тиску, галюцинації, екстрапірамідні розлади, зупинка дихання та серцевої діяльності.

У разі передозування проводять симптоматичне лікування.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° С.

Категорія відпустки

За рецептом

Інструкція препарату Церукал представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Церукалу з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!