Де-нол

Состав

Действующее вещество препарата Де-нол – висмута субцитрат коллоидный.

Фармакологические свойства

Де-нол - противоязвенный препарат, в состав которого входит висмута субцитрат. Попадая в желудок, Висмут субцитрат коллоидный, на поверхности язв и эрозий образовывает защитную от кислой среды пленку, при этом увеличивается синтез простагландина Е2, который стимулирует синтез желудочной слизи и бикарбонатов. Вместе эти процессы приводят к заживлению и рубцеванию в желудке и двенадцатиперстной кишке.

Препарат имеет бактерицидное действие к бактерии Helicobacter pylori.

Показания

- язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- хронический гастрит;
- в комплексной терапии Helicobacter pylori.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой по 120 мг №56, №112 в блистерах.

Способ применения

Принимать за 30 минут до еды, запивая небольшим количеством воды. Взрослые и дети от 14 лет: по 1 таблетке 4 раза в день или по 2 таблетки 2 раза в сутки. Дети от 8 до 14 лет: по 1 таблетке 2 раза в день. Дети от 4 до 8 лет: суточная доза рассчитывается по весу ребенка – 8 мг на 1кг массы на сутки, но не более 2 таблеток в сутки. Курс лечения от 4 до 8 недель, далее необходим перерыв в приёме не менее 2 месяцев. В терапии Helicobacter pylori следует придерживаться рекомендаций врача. Препарат Де-нол можно применять детям от 4 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременным и кормящим не рекомендуется принимать препарат Де-нол.

Особенности по применению

При приёме препарата Де-нол, возможно окрашивание кала в черный цвет - в таком случае нужна дополнительная консультация врача.

Приём антацидов или молока за 30 минут до и после еды, нейтрализует желудочный сок и как следствие сводит эффективность Висмута субцитрат коллоидного практически к нулю.

Не рекомендуется длительный приём высоких доз препаратов Висмута, поскольку в редких случаях возможно возникновения обратной энцефалопатии. При соблюдении дозирования риск возникновения этого побочного эффекта очень мал.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к висмуту субцитрату коллоидному или вспомогательным веществам;
- тяжелая почечная недостаточность.

Побочные эффекты

Окрашивание кала в черный цвет, тошнота, рвота, запор, диарея, сыпь или зуд на коже, анафилактические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия

Перед приёмом препарата не следует употреблять антациды, молоко, фрукты, соки.

Одновременное применение препаратов, содержащих висмут, повышает риск увеличения концентрации висмута в крови.

Висмута субцитрат коллоидный уменьшат всасывание антибиотиков ряда тетрациклинов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Нет данных о влиянии препарата Де-нол на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Передозировка

Острая передозировка может привести к почечной недостаточности с отсрочкой в проявлении симптомов до 10 дней.

Лечение: после разового приёма высокой дозы нужно промыть желудок, далее принимать активированный уголь и осмотические слабительные средства.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25° С, в недоступном для детей месте.

Категория отпуска

Без рецепта.

Инструкция препарата Де-нол представлена исключительно с ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Де-нола с целью лечения, его дозировки, схемы лечения, противопоказания и совместимостью с другими медикаментами, может предоставить только ваш лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!