

Долобене

Состав

Активные вещества Долобене: гепарин натрия, декспантенол, диметилсульфоксид

Фармакологические свойства

Долобене является комбинированным препаратом, который оказывает противовоспалительное, противоотечное и местное обезболивающее действие. Продолжительность действия наблюдается до 12 часов.

Показания

- травмы, гематомы, повреждение мышц, периартикулярных структур или суставов;
- тендинит, тендовагинит, бурсит, плечелопаточный периартрит и эпикондилит плеча (синдром «локоть теннисиста»);
- острая невралгия;
- острый болевой синдром при поверхностных тромбофлебитах, флебитах, варикозном расширении вен.

Форма выпуска

Гель для наружного применения по 20 г, 50 г, 100 г в тубах.

Способ применения

Курс лечения препаратом Долобене назначается индивидуально и зависит от тяжести течения заболевания.

Гель наносят тонким слоем на пораженные участки или вокруг них, равномерно распределяют по поверхности кожи легкими втирающими движениями 2 – 4 раза в сутки. При наложении повязок с Долобене перевязочный материал налаживают только после того как большая часть геля впитается в кожу и испарится содержащий в составе препарата спирт, это занимает несколько минут.

При использовании ионофореза гель наносят на катод. Также Долобене используют при проведении фонофореза.

Противопоказан детям до 5 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Противопоказан для применения в период беременности и кормления грудью.

Особенности по применению

Не следует использовать Долобене в комбинации с другими мазями и гелями.

Во время лечения может возникнуть фотосенсибилизация, потому нужно избегать воздействий прямых солнечных лучей и посещений солярия.

Долобене нельзя наносить на слизистые оболочки глаз, носа, рта, открытые раны, поврежденные участки кожи, послеоперационные рубцы.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к одному из компонентов Долобене;
- бронхиальная астма;
- тяжелые нарушения функции печени и почек;
- выраженные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы;
- открытые раны в месте нанесения.

Побочные эффекты

- местные кожные реакции: покраснение, зуд, чувство жжения на месте нанесения геля;
- возникновение запаха чеснока изо рта, изменение вкусовых качеств;
- отек Квинке, крапивница.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия

Одновременное применение Долобене с сулиндаком может привести к возникновению тяжелых токсических реакций, таких как периферическая нейропатия.

Активное вещество препарата – диметилсульфоксид усиливает специфическую и токсическую активность некоторых лекарственных средств, потому следует избегать одновременного применения других препаратов местного действия и Долобене.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Не влияет.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25° С.

Категория отпуска

Без рецепта.

Инструкция препарата Долобене представлена исключительно с ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Долобене с целью лечения, его дозировки, схемы лечения, противопоказания и совместимостью с другими медикаментами, может предоставить только ваш лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!