

Долобене

Склад

Активні речовини Долобене: гепарин натрію, декспантенол, диметилсульфоксид

Фармакологічні властивості

Долобене є комбінованим препаратом, який має протизапальну, протинабрякову і місцеву знеболювальну дію. Тривалість дії спостерігається до 12 годин.

показання

- травми, гематоми, ушкодження м'язів, періартикулярних структур або суглобів;
- тендиніт, тендовагініт, бурсит, плечолопатковий періартрит і епікондиліт плеча (синдром «лікоть тенісиста»);
- гостра невралгія;
- гострий больовий синдром при поверхневих тромбофлебітах, флебітах, варикозному розширенні вен.

Форма випуску

Гель для зовнішнього застосування по 20 г, 50 г, 100 г у тубах.

Спосіб застосування

Курс лікування препаратом Долобене призначається індивідуально і залежить від тяжкості перебігу захворювання.

Гель наносять тонким шаром на уражені ділянки або навколо них, рівномірно розподіляють по поверхні шкіри легкими втираючими рухами 2 - 4 рази на добу. При накладенні пов'язок з Долобене перев'язувальний матеріал налагоджують тільки після того як більша частина гелю вбереться в шкіру і випарується містить в складі препарату спирт, це займає кілька хвилин.

При використанні іонофореза гель наносять на катод. Також Долобене використовують при проведенні фонофорезу.

Протипоказаний дітям до 5 років.

Застосування в період вагітності або годування груддю:

Протипоказаний для застосування в період вагітності та годування груддю.

Особливості по застосуванню

Не слід використовувати Долобене в комбінації з іншими мазями і гелями.

Під час лікування може виникнути фоточутливість, тому потрібно уникати впливів прямих сонячних променів і відвідувань солярію.

Долобене не можна наносити на слизові оболонки очей, носа, рота, відкриті рани, пошкоджені ділянки шкіри, післяопераційні рубці.

Протипоказання

- підвищена чутливість до одного з компонентів Долобене;
- бронхіальна астма;
- тяжкі порушення функції печінки і нирок;
- виражені порушення з боку серцево-судинної системи;
- відкриті рани в місці нанесення.

Побічні ефекти

- місцеві шкірні реакції: почервоніння, свербіж, відчуття печіння на місці нанесення гелю;
- виникнення запаху часнику з рота, зміна смакових якостей;
- набряк Квінке, кропив'янка.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

Одночасне застосування Долобене з суліндаком може привести до виникнення важких токсичних реакцій, таких як периферична нейропатія.

Активна речовина препарату - диметилсульфоксид підсилює специфічну і токсичну активність деяких лікарських засобів, тому слід уникати одночасного застосування інших препаратів місцевої дії і Долобене.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Передозування

Дані про передозування відсутні.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° С.

Категорія відпустки

Без рецепта.

Інструкція препарату Долобене представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Долобене з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!