

# Еспумізан L краплі ор., емульс. 40 мг/мл по 30 мл

**Склад:**

Діюча речовина: simeticone

1 мл крапель оральних, емульсії (25 крапель) містить симетикону 40 мг;

Допоміжні речовини: поліетиленгліколю стеарат, гліцеролу моностеарат, карбомери, банановий ароматизатор\*, калію ацесульфам, сорбіту розчин, що не кристалізується (Е 420), натрію хлорид, натрію цитрат, натрію гідроксид, кислота сорбінова, вода очищена.

\* Містить смакові речовини, ідентичні натуральним, та пропіленгліколь.

**Лікарська форма:**

Краплі оральні, емульсія.

**Основні фізико-хімічні властивості:** Низьков'язка емульсія молочно-білого кольору.

**Фармакотерапевтична група:**

Засоби, що застосовуються при функціональних розладах шлунково-кишкового тракту. Інші засоби, що застосовуються при функціональних розладах шлунково-кишкового тракту. Силікони. Код АТХ А03А Х13.

**Фармакологічні властивості:***Фармакодинаміка.*

Еспумізан® L містить як діючу речовину симетикон – стабільний поверхнево-активний полідиметилсилоксан. Він змінює поверхневий натяг пухирців газу, що містяться у харчовій кашці та слизові травного тракту, у результаті чого вони розпадаються. Вивільнені гази можуть потім всмоктуватись стінками кишечника, а також виводитись завдяки перистальтиці кишечника.

Симетикон чинить винятково фізичну дію, у хімічних реакціях він участі не бере і є інертним у фармакологічному та фізіологічному відношеннях.

*Фармакокінетика.*

Симетикон не всмоктується при пероральному прийомі і виводиться у незміненому вигляді через шлунково-кишковий тракт.

### **Показання:**

Для симптоматичного лікування при скаргах з боку шлунково-кишкового тракту, пов'язаних із газоутворенням, наприклад, при метеоризмі, при коліках у немовлят.

Як допоміжний засіб при діагностичних дослідженнях черевної порожнини, таких як рентгенологічні дослідження, ультразвукова діагностика та підготовка до гастродуоденоскопії.

Як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (пральними порошками або миючими засобами).

Протипоказання

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, повна кишкова непрохідність.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій:**

На сьогодні невідомі.

### **Особливості застосування:**

При першій появі та/або стійких скаргах на порушення з боку черевної порожнини слід проводити клінічне обстеження.

Даний лікарський засіб містить сорбіт. Пацієнтам із рідкісною спадковою непереносимістю фруктози не слід застосовувати даний лікарський засіб.

Еспумізан® L слід застосовувати з обережністю пацієнтам із обструктивними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю:**

Жодних ефектів у період вагітності та годування груддю не очікується, оскільки системний вплив симетикону незначний. Еспумізан® L можна застосовувати у період вагітності та годування груддю.

*Фертильність.*

Неклінічні дані не свідчать про особливу небезпеку для людей щодо фертильності.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Еспумізан® L не чинить жодного або чинить незначний вплив на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами.

### **Спосіб застосування та дози:**

*Дози.*

25 крапель відповідають 1 мл емульсії.

*Для симптоматичного лікування при скаргах з боку шлунково-кишкового тракту, пов'язаних із газоутворенням*

*наприклад, при метеоризмі, при коліках у немовлят:*

Вік

Дозування у краплях

Частота застосування

Діти до 1 року

25 крапель (1 мл) додати у пляшку з дитячим харчуванням при кожному годуванні або за допомогою маленької ложки давати до або після годування груддю

Діти віком 1 – 6 років

25 крапель (1 мл)

3 – 5 разів на добу

Діти віком 6 – 14 років

25 – 50 крапель (1-2 мл)

3 – 5 разів на добу

Діти віком від 14 років і дорослі

50 крапель (2 мл)

3 – 5 разів на добу

*Як допоміжний засіб при діагностичних дослідженнях черевної порожнини*

*Рентгенологічне дослідження, ультразвукова діагностика:*

За добу до проведення дослідження

Вранці у день дослідження

По 2 мл 3 рази на добу (по 50 крапель 3 рази на добу)

2 мл (50 крапель)

*Як добавка до суспензії контрастних речовин:*

4 – 8 мл (100 – 200 крапель) на 1 літр суспензії контрастної речовини для отримання зображення з подвійним контрастуванням

*Для підготовки до гастродуоденоскопії:*

Перед проведенням ендоскопії застосовувати 4 – 8 мл (100 – 200 крапель)

У разі необхідності під час дослідження через інструментальний канал ендоскопа можна ввести декілька мілілітрів емульсії для усунення пухирців газу

*Як антидот при отруєннях поверхнево-активними речовинами*

*Залежно від тяжкості отруєння:*

Вік  
Дозування  
Діти

2,5 – 10 мл (від 65 крапель до 1/3 вмісту флакона)

Дорослі

10 – 20 мл (від 1/3 до 2/3 вмісту флакона)

### **Спосіб застосування:**

Еспумізан® L приймати під час або після їди, а у разі необхідності – перед сном.

Еспумізан® L можна застосовувати також у післяопераційний період.

Перед застосуванням збовтати; для дозування крапель флакон тримати вертикально отвором вниз.

Тривалість лікування залежить від наявності скарг та вирішується лікарем індивідуально.

При необхідності Еспумізан® L можна застосовувати протягом тривалого часу (див. розділ «Особливості застосування»)

Діти.

Лікарський засіб можна застосовувати у педіатричній практиці.

### **Передозування:**

До цього часу випадки передозування невідомі. Оскільки симетикон у хімічному та фізіологічному відношенні інертний, то інтоксикація практично виключена. Навіть значна кількість прийнятого препарату Еспумізан® L переноситься безсимптомно. У разі застосування доз більших, ніж рекомендовано, слід звернутися до лікаря.

### **Побічні реакції:**

В окремих випадках при застосуванні Еспумізану® L спостерігалися шкірні реакції гіперчутливості, включаючи свербіж, шкірний висип, кропив'янку.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції.

У разі виникнення будь-якої побічної реакції, у т.ч. такої, що не зазначена в даній інструкції, проконсультуйтеся з лікарем або провізором. Дуже важливо повідомляти про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу. Це дає змогу безперервно спостерігати за співвідношенням користь/ризик лікарського засобу.

**Термін придатності:**

3 роки.

Термін придатності після першого відкриття – 6 місяців.

Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

**Умови зберігання:**

Спеціальні умови зберігання не вимагаються. Зберігати у недоступному для дітей місці!

**Упаковка:**

По 30 або по 50 мл у флаконі із крапельницею-вставкою та пробкою; по 1 флакону в картонній коробці.

**Категорія відпуску:**

Без рецепта.

**Виробник:** Берлін-Хемі, Німеччина

Інструкція препарату представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Еспумізану емульсії з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!