# Геделикс

**Состав**
действующее вещество: листья плюща экстракт густой;

1 мл (31 капель) раствора содержит листья плюща экстракта густого (Hederae helicis folii extractum spissum) (2,2 - 2,9: 1) 0,04 г

вспомогательные вещества: пропиленгликоль, глицерин, масло аниса звездчатого, масло эвкалиптовое, ментол, масло мяты перечной.

**Лекарственная форма**
Капли оральные, раствор.

**Основные физико-химические свойства**: прозрачная зеленовато-коричневый вязкий раствор с ароматным запахом.

**Фармакологическая группа**
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05C A12.

**Фармакологические свойства**
**Фармакодинамика.**

Геделикс капли без спирта - лекарственное средство растительного происхождения, содержит активное вещество листьев плюща экстракт густой, терапевтическое действие которого при воспалительных заболеваниях дыхательных путей основывается на секретолитическое, муколитическом и спазмолитическому действия гликозидных сапонинов, содержащихся в листьях плюща.

Терапевтическое действие предсказуемо обусловлена раздражением слизистой оболочки желудка, при котором секреторные бронхиальные железы слизистой оболочки бронхов рефлекторно стимулируются чувствительными волокнами парасимпатической системы.

**Фармакокинетика.**

Отсутствуют данные о проведении испытаний.

**Показания**
Симптоматическое лечение кашля при простудных заболеваниях дыхательных путей, хронических воспалительных заболеваниях бронхов.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или других растений семейства аралиевых, детский возраст до 2 лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов, бронхиальная астма и другие заболевания дыхательных путей, сопровождающихся выраженной чувствительностью дыхательных путей, недостаточность в организме аргининосукцинатсинтетазы (нарушение обмена веществ в цикле мочевины).

Склонность к ларингоспазму.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

**Особенности применения**

Если улучшения состояния больного не наступает, симптомы сохраняются в течение длительного времени (более 4-5 дней) или в случае появления приступов удушья, отхождение гнойной мокроты или мокроты с кровью, а также при повышении температуры тела следует немедленно обратиться к врачу.

Поскольку Геделикс капли без спирта не содержит этанола и сахара, его можно применять больным сахарным диабетом.

Если улучшения состояния больного не наступает или беспокоит одышка, гнойная мокрота, а также при повышении температуры тела необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение детям 2-4 лет нуждается в рекомендации врача. Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с противокашлевыми препаратами, например, кодеин или декстрометорфан. С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.**

Предполагается, что лекарственное средство не оказывает действия при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

**Способ применения и дозы**

Геделикс капли без спирта следует применять неразбавленным, независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством воды.

Детям рекомендуется давать препарат разведенным в фруктовом соке или чае.

Длительность лечения зависит от вида и тяжести заболевания, но даже при легком течении заболеваний дыхательных путей лечения необходимо проводить не менее одной недели. После исчезновения симптомов болезни лечение еще следует продолжить 2-3 дня.

Продолжительность применения препарата без консультации с врачом не должна превышать несколько дней.

Противопоказан детям до 2 лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов.

**Передозировка**

Симптомы: тошнота, рвота, диарея, гастроэнтерит и возбуждения.

Лечение симптоматическое.

**Побочные реакции**

Со стороны иммунной системы:

Аллергические реакции (преимущественно сыпь), включая одышку, отек слизистых оболочек, отек Квинке сыпь и крапивница, зуд, кожные реакции (кожная сыпь), купероз.

Со стороны щлунково-кишечного тракта:

У пациентов с повышенной чувствительностью иногда могут возникать расстройства желудочно-кишечного тракта, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.

**Срок годности**

5 лет.

Срок годности после вскрытия флакона - 6 месяцев.

Образование осадка и помутнения препарата, которая может возникнуть при хранении в течение срока годности, не уменьшает активности препарата и не является препятствием для его применения.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

Флакон-капельница по 50 мл, по 1 флакону-капельнице в картонной коробке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**
Кревель Мойзельбах ГмбХ / Krewel Meuselbach GmbH.

Инструкция препарата Геделикс представлена исключительно с ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Геделикса с целью лечения, его дозировки, схемы лечения, противопоказания и совместимостью с другими медикаментами, может предоставить только ваш лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!