Геделикс

Состав.

Действующее вещество: листья плюща экстракт густой;

5 мл сиропа содержат листья плюща экстракта густого (HederahelixL., Folii extractum spissum) (2,2 - 2,9: 1) 0,04 г (Экстрагент: этанол * 50% (об / об): пропиленгликоль 98: 2 (м / м));

* Готовый продукт не содержит этанол;

Вспомогательные вещества: макрогол глицерилгидроксистеарат; масло аниса звездчатого; гидроксиэтилцеллюлоза; сорбита раствор 70%, что не кристаллизуется (Е 420) пропиленгликоль; глицерин вода очищенная.

Лекарственная форма.

Сироп

Основные физико-химические свойства: густоватая жидкость от желтого до желтовато-коричневого цвета со специфическим запахом.

При хранении может образовываться осадок, при взбалтывании вызывает помутнение.

Фармакологическая группа.

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТС R05C A12.

Фармакологические свойства

Фармакологические

Геделикс® Сироп от кашля - лекарственное средство растительного происхождения, содержит как активное вещество листьев плюща экстракт густой, терапевтическое действие которого при воспалительных заболеваниях дыхательных путей основывается на секретолитическое, муколитическом и спазмолитическому действия гликозидных сапонинов, содержащихся в листьях плюща.

Терапевтическое действие предсказуемо обусловлена подразненнямслизовои оболочки желудка, при котором секреторные бронхиальные железы слизистой оболочки бронхов рефлекторно стимулируются чувствительными волокнами парасимпатической системы.

Фармакокинетика

Отсутствуют данные о проведенных испытаний.

Клинические характеристики

Показания.

Симптоматическое лечение кашля при простудных заболеваниях дыхательных путей, хронических воспалительных заболеваниях бронхов.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или других растений семейства аралиевых, недостаточность в организме аргининосукцинатсинтетазы (нарушение обмена веществ в цикле мочевины). Препарат не следует принимать при наследственной непереносимости фруктозы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Неизвестна.

Особенности применения.

Поскольку Геделикс® Сироп от кашля не содержит этанола и сахара, его можно применять больным сахарным диабетом.

Геделикс® Сироп от кашля пригоден для лечения больных сахарным диабетом 5 мл сиропа содержат 1,75 г сорбита (соответствует 0,44 г фруктозы), что составляет примерно 0,15 ХЕ (хлебных единиц). 1 ХЕ соответствует количеству продуктов питания, в которых содержится 12 г углеводов.

Сорбит может вызвать незначительную слабительное действие.

Если беспокоит одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с другими противокашлевыми препаратами, например, с кодеином абодекстрометорфаном. С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка.

Применение у детей 2-4 лет нуждается в рекомендации врача.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Препарат может проявлять незначительное влияние на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами.

Способ применения и дозы.

Геделикс® Сироп от кашля следует применять неразбавленным, независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством жидкости (желательно воды).

Длительность лечения зависит от вида и тяжести заболевания, но даже при легком течении заболеваний дыхательных путей лечения необходимо проводить не менее одной недели. После исчезновения симптомов болезни лечение еще следует продолжить 2-3 дня.

Продолжительность применения препарата без консультации с врачом не должна превышать несколько дней.

Применение препарата для разных возрастных групп:

Взрослые и дети от 10 лет – 5 мл 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза 15 мл (соответствует 300 мг сухих листьев плюща в сутки).

Дети 4-10 лет – 2,5 мл 4 раза в сутки. Максимальная суточная доза 10 мл (соответствует 200 мг сухих листьев плюща в сутки).

Дети 2-4 года – 2,5 мл 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза 7,5 мл (соответствует 150 мг сухих листьев плюща в сутки).

В упаковке Геделикс® Сироп от кашля находится мерная ложка емкостью 5 мл, которая имеет деления 1/4, 1/2 и 3/4, соответствующие 1,25 мл, 2,5 мл и 3,75 мл.

Если улучшения состояния больного не наступает, симптомы сохраняются в течение длительного времени (более 4-5 дней) или в случае появления приступов удушья, отхождение гнойной мокроты или мокроты с кровью, а также при повышении температуры тела следует немедленно обратиться к врачу.

Дети.

Противопоказан детям до 2 лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов.

Передозировка.

Симптомы: тошнота, рвота, диарея, гастроэнтерит и возбуждения.

Лечение симптоматическое.

Побочные реакции.

Частота возникновения побочных реакций, приведенных ниже, оценивается следующим образом:

очень часто (> 1/10); часто (> 1/100, <1/10); нечасто (> 1/1 000, <1/100); редко (> 1/10 000,

<1/1 000) очень редко (> 1/10 000).

Иммунная система.

Очень редко аллергические реакции (преимущественно высыпания и др.), Включая одышку, отек Квинке, одышка, экзантему и крапивницу, зуд, кожные реакции (кожная сыпь), купероз.

Желудочно-кишечный тракт.

Нечасто у пациентов с повышенной чувствительностью могут возникать расстройства желудочно-кишечного тракта, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.

Срок годности.

5 лет.

Срок годности после вскрытия флакона - 6 месяцев.

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше 25 ° С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 100 мл во флаконе; по 1 флакону вместе с мерной ложкой в картонной коробке.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

Кревель Мойзельбах ГмбХ / Krewel Meuselbach GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Кревельштрассе 2, 53783 Айторф, Германия / Krewelstrasse 2, 53783 Eitorf, Germany.

Инструкция препарата Геделикс представлена исключительно с ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Геделикса с целью лечения, его дозировка, схему лечения, противопоказания и совместимость с другими медикаментами, может предоставить только ваш лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!