

"Одобрено"  
Фармакологическим Комитетом  
МИНЗДРАВА РОССИИ  
«13» ноя 2000г.  
пр. № 10

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата  
**СТОПТУССИН**  
(Stoptussin)

**Регистрационный номер:**

**Торговое (патентованное) название препарата - СТОПТУССИН**

**Международное непатентованное название** - нет

**Лекарственная форма** - капли для приема внутрь

**Состав препарата:** 10 мл раствора содержат  
*активные компоненты*- Гвайфенизин 1,0 г, бутамирата дигидрогеноцитрат 0,04 г  
*вспомогательные вещества:* этанола 95% 3,0 г, полисорбит 80 0,01 г,  
пропиленгликоль до 10 мл.

**Описание:** Прозрачная вязкая жидкость, от желтого до желто-коричневого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** противокашлевое, муколитическое и отхаркивающее средство.

**Фармакологические свойства:**

Комбинированный препарат, оказывающий противокашлевое, муколитическое и отхаркивающее действие. Входящий в состав препарата бутамирата дигидроцитрат обладает периферическим местноанестезирующим действием на рецепторы бронхов, что обеспечивает противокашлевой эффект. Кроме того, он обладает умеренным бронхолитическим эффектом. Гвайфенизин снижает вязкость мокроты и тем самым улучшает ее отхождение.

**Показания к применению**

Сухой, раздражающий кашель (в том числе при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних и нижних отделов дыхательных путей).

**Противопоказания:**

- гиперчувствительность к составляющим препарат компонентам,
- миастения,
- первый триместр беременности.

### **Способ применения и дозы:**

Доза препарата зависит от массы тела пациента:

до 7 кг	по 8 капель 3 - 4 раза в сут.
7 - 12 кг	по 9 капель 3 - 4 раза в сут.
12 - 20 кг	по 14 капель 3 раза в сут.
20 - 30 кг	по 14 капель 3 - 4 раза в сут.
30 - 40 кг	по 16 капель 3 - 4 раза в сут.
40 - 50 кг	по 25 капель 3 раза в сут.
50 - 70 кг	по 30 капель 3 раза в сут.
70 - 90 кг	по 40 капель 3 раза в сут.

Соответствующее количество капель растворяют в 100 мл жидкости (вода, чай, фруктовый сок); принимать желательнее после еды.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препараты лития и магния усиливают действие гвайфенезина. Одновременное назначение гвайфенезина с парацетамолом или ацетилсалициловой кислотой повышает анальгетический эффект последних. Гвайфенезин усиливает действие алкоголя, седативных, снотворных средств и общих анестетиков на ЦНС, усиливает действие миорелаксантов.

### **Беременность и лактация**

Беременным женщинам препарат назначается только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает любой возможный риск для плода. Учитывая отсутствие данных по выделению препарата в материнское молоко, назначение Стоптусина в период лактации возможно только в том случае, если польза для матери оправдывает потенциальный риск для ребенка.

### **Побочное действие :**

При соблюдении рекомендуемой дозировки пациенты переносят препарат хорошо. Гвайфенезин может в редких случаях вызывать тошноту, рвоту, понос, боли в желудке, головокружение, головную боль, крапивницу и кожную сыпь.

### **Передозировка**

При передозировке преобладают признаки токсического воздействия гвайфенезина. К этим признакам относятся сонливость, тошнота и рвота. Против гвайфенезина нет специфического антидота. Мероприятия в случае передозировки - промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

### **Форма выпуска**

10 мл раствора в стеклянном флаконе с крышечкой-капельницей помещенные в картонный пенал с инструкцией по применению.

**Условия хранения :** Препарат хранить при температуре от 10°C до 25°C, в защищенном от света месте. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 5 лет. Не использовать после даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта врача.

Изготовитель:

Галена А. О.  
Оставска 29  
747 70 Опава - Комаров  
Чешская Республика.

