

# Кропиви листя

## Склад

*діюча речовина:* кропиви листя

## Лікарська форма

Листя.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки листя різної форми. Колір темно-зелений, темно-сірувато-зелений, коричнювато-зелений, зелений.

## Фармакотерапевтична група

Вітамін К та інші гемостатичні засоби. Код АТХ В02В Х.

## Фармакологічні властивості

*Фармакодинаміка.*

Біологічно активні речовини препарату чинять кровоспинну, діуретичну, загальнозміцнювальну, протизапальну та судинозвужувальну дію, сприяють збільшенню вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів, нормалізують склад крові, знижують рівень цукру у крові, сприяють регенерації слизових оболонок травного тракту, нормалізують ліпідний обмін.

## Показання

Легеневі, кишкові, маткові, гемороїдальні та інші кровотечі; анемії різної етіології, захворювання травного тракту (гастрити, коліти, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки).

## Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищене згортання крові, кровотечі, спричинені кістою, поліпами та іншими пухлинами матки та її придатків; артеріальна гіпертонія.

## Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

## Особливості застосування

*Застосування у період вагітності або годування груддю* Протипоказано у період вагітності. У жінок, які годують груддю, посилює лактацію .

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.*

### **Спосіб застосування та дози**

2 десертні ложки листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати у проціджений настій. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплом вигляді 2-3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 12 років – по ¼-½ склянки, дітям віком 5-7 років – по 1 столовій ложці, 7-12 років – по 2 столові ложки. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплом вигляді 2-3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 12 років – по ½-1 склянці, дітям віком 5-7 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по ¼ склянки.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

*Діти.* Препарат застосовувати дітям віком від 5 років.

### **Передозування**

Повідомлення відсутні.

### **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). Нудота, блювання, діарея, біль у ділянці шлунка. У разі виникнення побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

### **Термін придатності**

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

### **Упаковка**

По 30 г, 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник/Заявник**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола». Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Інструкція Кропиви листя представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні лиятя кропиви з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш лікуючий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!