

Крушини кора

Склад:

Діюча речовина: кора крушини (Frangulae cortex);

1 пачка містить кори крушини (Frangulae cortex) – 50 г або 100 г; 1 фільтр-пакет містить кори крушини (Frangulae cortex) – 1,5 г.

Лікарська форма:

Кора.

Основні фізико-хімічні властивості:

Подрібнена сировина: шматочки кори різної форми, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір кори з зовнішньої поверхні темно-бурий, сіро-бурий, темно-сірий або сірий, з внутрішньої – жовтувато-оранжевий або червоно-бурий;

Порошок крупний: порошок жовто-бурого кольору, що проходить крізь сито з отворами розміром 2 мм.

Для усіх видів сировини запах слабкий, смак гіркуватий.

Фармакотерапевтична група:

Проносні засоби. Код АТХ А06А В07.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять м'яку проносну дію, механізм якої полягає у посиленні перистальтики товстої кишки, не подразнюючи слизової оболонки і не впливаючи на тонкий кишечник. Послаблювальна дія настає через 8-12 годин після застосування.

Фармакокінетика.

Фармакокінетика не визначалась.

Показання:

Атонія кишечника, звичайні запори.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Запори нейрогенного та ендокринного походження, спастичні запори, кишкова непрохідність, кровотечі, синдром гострого живота, апендицит, гострий гастроентероколіт, інші запальні процеси у черевній порожнині, гострі пропасні стани.

Особливі заходи безпеки:

Тривалий прийом препарату призводить до звикання та ослаблення або відсутності проносного ефекту. Щоб запобігти звиканню, доцільно чергувати з іншими проносними засобами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій:

Невідома.

Особливості застосування:

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози:

1 столову ложку кори помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 10 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплом вигляді дорослим по ½ склянки на ніч, дітям віком від 12 років – по ¼-½ склянки на ніч. Перед застосуванням відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хвилин. Застосовувати у теплом вигляді дорослим до 100 мл на ніч, дітям віком від 12 років – по ¼-½ склянки (50-60 мл) на ніч.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Рекомендується застосування препарату дітям віком від 12 років.

Передозування:

При передозуванні можливі колікоподібний біль у животі, тенезми, відчуття дискомфорту. При появі вказаних симптомів слід припинити прийом препарату.

Лікування – симптоматичне.

Побічні реакції:

При тривалому застосуванні можуть розвинутися діарея з метаболічними порушеннями, дегідратація, зниження функції ферментів кишечника, атонія товстого кишечника, колікоподібний біль, алергічні реакції.

Термін придатності:

5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготований відвар (настій) – у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.

Упаковка:

По 50 г або по 100 г у пакети з вкладанням у пачку; по 1,5 г у фільтр-пакети з наступною укладкою по 20 фільтр-пакетів у пачки.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Виробник: Віола, Україна

Інструкція препарату представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Крушини кори з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!