

# Квамател

## Склад

Діюча речовина Кваматела - фамотидин.

## Фармакологічні властивості

Квамател - антисекреторное засіб, блокатор H<sub>2</sub>-рецепторів, в зв'язку з чим знижує секрецію шлункового соку.

## Показання

- виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки;
- профілактика рецидиву виразки шлунка і дванадцятипалої кишки;
- гастроезофагеальна рефлюксна хвороба;
- синдром Золлінгера-Еллісона;
- профілактика аспірації кислого шлункового вмісту при проведенні загальної анестезії.

## Форма випуску

таблетки, вкриті оболонкою 20 мг № 28 (14x2) у блістері

таблетки, вкриті оболонкою 40 мг № 14 (14x1) у блістері.

ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій по 5 мл №5 у флаконах з розчинником.

## Спосіб застосування

Таблетки Квамател: призначається дорослим і дітям старше 12 років. Застосовує всередину незалежно від прийому їжі, а не розжовуючи, запиваючи склянкою води.

При гострій виразці шлунка і дванадцятипалої кишки застосовується по 40 мг 1 раз на добу, перед сном або по 20 мг 2 рази на добу, вранці і ввечері. Курс лікування становить 4-8недель.

Для профілактики рецидивів виразок шлунка і дванадцятипалої кишки застосовується по 20 мг 1 раз на добу, перед сном. Курс лікування-1-4 тижні.

При ГЕРХ застосовується по 20 мг препарату 2 рази на добу, вранці і ввечері, курсом в 6 тижнів, при наявності езофагіту по 20-40 мг курсом в 12 тижнів.

При синдромі Золлінгера-Еллісона початкова доза становить 20 мг кожні 6 годин. Надалі дозу коригують індивідуально в залежності від стану хворого.

Розчин для ін'єкцій можна вводити тільки внутрішньовенно! Готувати розчин препарату необхідно безпосередньо перед застосуванням. У розведеному вигляді стабільний протягом 24 годин при кімнатній температурі.

При синдромі Золлінгера-Еллісона початкова доза становить 20 мг внутрішньовенно кожні 6 ч. Надалі доза залежить від секреції соляної кислоти і клінічного стану хворого.

Перед проведенням загальної анестезії дорослим вводять в / в 20 мг препарату вранці в день операції або не менше ніж за 2 години до початку операції.

Таблетки - не застосовують у дітей до 12 років.

Застосування в період вагітності або годування груддю:

Препарат протипоказаний в період вагітності та годування груддю.

### **Особливості по застосуванню**

Перед початком лікування необхідно виключити можливість наявності злоякісного захворювання стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки.

З обережністю застосовувати у пацієнтів з печінковою недостатністю.

Якщо ліки необхідно взяти при одночасному прийомі кваматела в комбінації з антацидами, то перерва між прийомом препаратів повинна бути не менше 1-2 годин.

З обережністю застосовувати при гострій порфірії і імунодефіцит.

### **Протипоказання**

- підвищена чутливість до фамотидину або до будь-якого іншого компоненту препарату;
- вагітність і годування груддю;
- діти до 12 років.

### **Побічні ефекти**

- запор, діарея, блювота, біль у животі, зниження апетиту, гострий панкреатит;
- алопеція, свербіж, висипи, сухість шкіри;
- зниження артеріального тиску, брадикардія, аритмія;
- головний біль, запаморочення, шум у вухах, дратівливість, галюцинації, депресія, страх;
- підвищена стомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту;
- лейкопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, панцитопенія;
- нечіткість зорового сприйняття, розлади акомодатії;
- артралгія, м'язові спазми;
- гіперпролактинемія, гінекомастія, аменорея, зниження лібідо, імпотенція.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії**

Внаслідок підвищення рН вмісту шлунка при одночасному прийомі може зменшитися всмоктування ітраконазолу і кетоконазолу.

Квамател порошок ліофілізований можна застосовувати разом з розчинами для інфузій: розчин глюкози з калієм; розчин лактату натрію; розчин глюкози 5%; розчин Рінгера; розчин Рінгера з молочною кислотою; розчин салсол А - розчин хлориду натрію 0,9%.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

З огляду на те, що в чутливих хворих при лікуванні кваматела можуть виникнути запаморочення, галюцинації, порушуватися чіткість зображення, то під час лікування не варто керувати автотранспортом або іншими механізмами.

### **Передозування**

У разі передозування препаратом відзначається блювота, рухове збудження, тремор, зниження артеріального тиску, тахікардія, шлуночкова аритмія і колапс. В такому випадку здійснюється симптоматичне лікування.

### **Умови зберігання**

У сухому, захищеному від світла місці, при температурі вище 25 ° С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

### **Категорія відпустки**

За рецептом.

Інструкція препарату Квамател представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Квамателу з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!