

Пентоксифілін Здоров'я

Склад.

Діюча речовина Пентоксифіліну - пентоксифілін.

Фармакологічні властивості.

Пентоксифілін - ангіопротектор, покращує мікроциркуляцію і реологічні властивості крові.

Препарат пригнічує фосфодіестерази, підвищує концентрацію циклічних аденозинмонофосфат в тромбоцитах і еритроцитах з одночасним насиченням енергетичного потенціалу, що призводить до вазодилатації, зниження загального периферичного опору судин, зростанню обсягу крові і хвилинного обсягу крові без особливих змін серцево судинних скорочень. Розширює коронарні артерії, збільшуючи транспорт кисню в міокард, судини легенів, тим самим покращуючи оксигенацію крові. Підвищує тонус дихальної мускулатури.

При введенні препарату внутрішньовенно посилюється колатеральний кровообіг, підвищується концентрація АТФ в головному мозку. Знижується в'язкість крові, підвищується еластичність еритроцитів і мікроциркуляція в зонах порушення кровопостачання. Після прийому всередину швидко всмоктується. Дія настає через годину після прийому.

Показання.

- порушення периферичного кровообігу (діабетична ангіопатія, облітеруючий ендартеріт);
- порушення трофіки тканин (варикозне розширення вен, трофічні виразки гомілки, гангрена, відмороження, посттромботичний синдром);
- діскуляторная енцефалопатія;
- вірусна нейроінфекція;
- порушення мозкового кровообігу (церебральний атеросклероз, ішемічні і постапоплексіческие стану);
- ішемічна хвороба серця, стан після перенесеного інфаркту міокарда;
- гострі порушення кровообігу в сітківці і судинній оболонці ока; отосклероз;
- дегенеративні зміни на тлі патології судин внутрішнього вуха з поступовим зниженням слуху;
- бронхіальна астма;
- імпотенція судинного генезу;
- профілактика порушень мікроциркуляції;
- успішно застосовується в практиці консервативного лікування остеохондрозу.

Форма випуску.

таблетки по 100 мг №30, №50;

таблетки по 200 мг №20;
розчин для ін'єкцій 20 мг / 5 мл №5; №10 в ампулах.

Спосіб застосування.

Препарат приймають всередину відразу після їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Дозу і курс лікування встановлює лікар залежно від стану хворого.

Дорослим призначають по 200 мг 3 рази на добу. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 1200 мг.

Курс лікування 2-3 тижні і більше.

Ампули застосовують внутрішньовенно крапельно, внутрішньом'язово доза і схема лікування встановлюється індивідуально.

Діти.

С обережністю застосовувати у дітей і підлітків у віці до 18 років.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Препарат не рекомендується застосовувати під час вагітності. Пентоксифілін виділяється з грудним молоком. При необхідності застосування в період лактації слід припинити грудне вигодовування.

Особливості по застосуванню.

У період застосування пентоксифіліну необхідно контролювати артеріальний тиск, можливий ризик гіпотензії. Так само потрібен контроль рівня цукру в крові і показників згортання крові.

При порушеннях функції нирок або тяжких порушеннях функції печінки потрібна корекція режиму дозування пентоксифіліну. Тютюновий дим може знижувати терапевтичну ефективність препарату.

Протипоказання.

- підвищена чутливість до будь-якого становить препарату;
- гострий інфаркт міокарда;
- шлунково-кишкова кровотеча;
- гострий геморагічний інсульт;
- крововилив у сітківку ока;
- аритмії, виражений атеросклероз коронарних або мозкових артерій;
- неконтрольована артеріальна гіпотензія;
- масивна кровотеча;
- порфірія.

Побічні ефекти.

- анафілактичні реакції;
- головний біль, запаморочення, безсоння, тремор, галюцинації;
- тахікардія, аритмія, стенокардія, гіпотонія;
- диспепсичні розлади;

- холестатичний гепатит, внутрішньопечінковий холестаза, загострення холециститу;
- атонія кишечника, шлунково-кишкові розлади, болі в животі, нудота, блювота, діарея;
- порушення зору, нечіткість зору, скотома, сльозотеча, кон'юнктивіт;
- біль у вухах, головний біль, крововиливи в сітківку, відшарування сітківки;
- тромбоцитопенія з тромбоцитопенічна пурпура, лейкопенія, панцитопенія;
- порушення смаку, слинотеча, нездужання, збільшення і болючість залоз в горлі і на шиї, ларингіт, закладеність носа.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.

При застосуванні пентоксифіліну з іншими лікарськими препаратами можливі такі взаємодії:

- пентоксифілін може посилювати дію препаратів, що впливають на систему згортання крові (непрямі і прямі антикоагулянти, тромболітики)
- підсилює дію антибіотиків, в тому числі цефалоспоринового ряду;
- збільшує ефективність гіпотензивних лікарських засобів, інсуліну і пероральних гіпоглікемічних лікарських засобів;
- з антигіпертензивними засобами, інсуліном, пероральними гіпоглікемічними препаратами може знадобитися зменшення дози пентоксифіліну;
- з кеторолаком і мелоксикамом можливе підвищення ризику розвитку кровотеч;
- з симпатолітиками, гангліоблокаторами і вазодилататорами - можливе зниження артеріального тиску;
- спільне призначення з іншими ксантинами може призводити до надмірного нервового збудження пацієнтів.
- з гепарином, фібринолітичними препаратами - посилення протизсідного дії.
- циметидин значно збільшує концентрацію пентоксифіліну в плазмі крові, може підвищуватися ймовірність розвитку побічних ефектів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

В період прийому препарату слід утриматися від керування транспортними засобами та виконання інших робіт, що потребують концентрації уваги.

Передозування.

При застосуванні високих доз препарату можуть виникнути такі симптоми: запаморочення, підвищення нервового збудження, сонливість, падіння артеріального тиску, судоми, втрата свідомості, шлунково-кишкова кровотеча, тахікардія.

Лікування симптоматичне.

Для зняття судом вводять діазепам, при необхідності проводять реанімаційні дії.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° С.

Категорія відпустки.

За рецептом.

Виробник.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Інструкція препарату Пентоксифілін представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Пентоксифіліну з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!