

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
21.08.08 № 485

Регистрационное удостоверение
№ UA/8838/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
РЕКУТАН
(REKUTAN)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: цветов ромашки экстракт жидкий (1 :1);

вспомогательные вещества: полисорбат-80, этанол 50%.

Лекарственная форма. Жидкость.

Жидкость темно-бурого цвета с запахом ромашки. Допускается образование осадка.

Название и местонахождение производителя. АО «Галичфарм».

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

Фармакотерапевтическая группа. Дерматологические препараты. Код АТС D11A X20**.

Рекутан имеет ряд эффектов, обусловленных химическими веществами, входящими в состав экстракта цветков ромашки, а именно противовоспалительный (угнетает экссудативные процессы), ранозаживляющий (стимулирует регенерацию тканей), а также оказывает отдельное антисептическое действие. Рекутан не обладает местнораздражающим действием. Продолжительное применение препарата не приводит к отрицательному влиянию на организм.

Показания к применению.

Монотерапия или в комплексной терапии для лечения стоматологических заболеваний (стоматит, гингивит, глоссит, пародонтит); заболеваний верхних дыхательных путей (фарингит, тонзиллит, в том числе после тонзилэктомии, ларингит, фаринго- и ларинготрахеит, хронический бронхит); в гастроэнтерологии (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, острый и хронический гастрит, дуоденит, колит и энтероколит различного происхождения); в проктологии (проктит, проктосигмоидит, геморрой, кожный зуд в анальной и перианальной области); в гинекологии (эрозия шейки матки, кольпит, цервицит, раневые дефекты промежности и влагалища, возникающие при родах).

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст.

Надлежащие меры безопасности при применении. Нельзя применять неразбавленный препарат.

Особенности применения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Препарат можно применять беременным и женщинам в период кормления грудью с учетом соотношения польза/риск, которое определяет врач.

Способность влиять на быстроту реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. При применении внутрь следует учитывать, что разовая доза препарата содержит 5% этанола.

Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует.

Способ применения и дозы. Препарат предназначен для взрослых. Рекутан применяют местно в виде полосканий, промываний, примочек (аппликаций), орошений. Кроме того, Рекутан принимают внутрь и вводят в прямую кишку.

Для вагинального промывания 2 - 3 столовые ложки Рекутана разводят в 1 л теплой воды. Назначают ежедневно 2 - 3 раза в сутки на протяжении 3 - 4 недель.

При заболеваниях слизистой оболочки ротовой полости – для полосканий: 2 чайные ложки препарата растворяют в стакане воды. При заболеваниях пародонта в этом растворе смачивают турунды, которые вводят в десенные карманы на 10-15 минут ежедневно, на протяжении 3 - 7 дней.

При заболеваниях верхних дыхательных путей – для ежедневных ингаляций (по 10 минут) на протяжении 10 дней.

При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки препарат принимают внутрь, в виде раствора: 1 чайная ложка препарата на ½ стакана теплой воды, за 20 мин до еды, 2 - 4 раза в день. Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от состояния больного. При колитах для усиления терапевтического эффекта вместе с приемом внутрь препарат целесообразно применять также в виде клизм. Для этого 1 - 2 чайные ложки Рекутана разводят в 1 стакане теплой воды и вводят в прямую кишку после произвольного опорожнения кишечника. Курс лечения состоит 3 - 4 недели.

При геморрое – для клизм и ванночек: 2 чайные ложки препарата на стакан теплой воды, 2 - 3 раза в сутки. При зуде в анальной и перианальной областях Рекутан применяют в виде местных ванночек с соблюдением указанного соотношения препарата и воды.

Передозировка. Данных нет.

Побочные эффекты. При индивидуальной повышенной чувствительности к ромашке возможны аллергические реакции (кожный зуд, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействий. Взаимодействие с лекарственными средствами пока не известно.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. В оригинальной упаковке при температуре от 15 °С до 25 °С.

Упаковка. По 100 мл во флаконах или банках стеклянных или флаконах полимерных вложенных в пачку.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего просмотра.

**Заместитель директора Государственного
Фармакологического центра МЗ Украины
д. мед. н., профессор**

В. Г. Лизогуб