Сенадексин

Состав и форма выпуска:

Основные активные компоненты: экстракт сенны, которые содержат кальциевые соли сенозидов А и В.

Вспомогательные компоненты: лактоза, крахмал, ванилин, магния стеарат, тальк, стеариновая кислота.

Производится в форме таблеток, по 70 мг экстракта сены.

Показания:

Данное лекарственное средство применяется для лечения проблем с опорожнением кишечника (запоров), которые вызваны атонией, вне зависимости от причин данного явления.

Также применяется во время подготовительных процедур при подготовке к проведению рентгенологической диагностики.

Противопоказания:

Рассматриваемое лекарственное средство противопоказано применять в случаях, когда у пациента имеется выраженная гиперчувствительность (аллергия) к основному или к одному из вспомогательных компонентов.

Противопоказано применение у пациентов, страдающих:

- острыми воспалительными заболеваниями ЖКТ, тошнотой, рвотой;
- недиагностированными заболеваниями пищеварительной системы, которые могут быть результатом острых кишечных заболеваний и/или хирургических вмешательств (дивертикулит, аппендицит, перитонит, частая диарея);
- кишечной непроходимостью/паралитической кишечной непроходимостью, грыжей;
- органическими поражениями печени;
- болями в эпигастрии неясной этиологии;
- кровотечениями ЖКТ, гинекологическими, циститом;

- тяжелыми нарушениями водно-солевого баланса (гипокалиемией).

Не следует применять препарат в лечении детей, не достигших 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудь:

Данный препарат возможно с осторожностью применять в лечении беременных женщин, т.к. может вызвать диарею, боли.

Если необходимо производить введение препарата в период грудного кормления, то на время лечения лактацию следует приостановить.

Способ применения и дозы:

Данный препарат вводят принимают в дозировке по 2 таблетки 1 или 2 раза в день (утром или утром и вечером). Запивать большим количеством жидкости.

4 таблетки в день является максимально допустимой суточной дозой.

Пожилые пациенты начинают прием с 1 таблетки 1 раз в день.
Доза в целом должна быть минимально эффективной.

Передозировка:

Передозировка может вызвать диарею и как следствие, нарушение водно-электролитного баланса.

Также могут возникнуть:

- колики в кишечнике;
- тошнота, боли в эпигастрии;
- судороги, нарушение работы кишечника;
- сосудистый коллапс;
- метаболический ацидоз.

В качестве лечения рекомендуется промывание желудка, регидратация, симптоматическая терапия.

Побочные эффекты:

Препарат может вызвать следующие побочные эффекты (обычно – обратимые, проходят после отмены препарата), как:

- анорексия, боли в животе, диарея;

- тошнота, рвота, метеоризм, атония толстого кишечника, нарушения
- пищеварения, колики (при злоупотреблении препаратом);
- окрашивание мочи в красный цвет;
- протеинурия, гематурия;
- потеря электролитов (чаще – калия), нарушение сердечной деятельности, коллапс, ощущение усталости, мышечная слабость, судороги (при злоупотреблении препаратом);
- аллергические реакции, в том числе сыпь, зуд, крапивница, локальная или генерализованая экзантема.

Условия и сроки хранения:
Срок годности – до 3 лет.

Условия хранения:
Хранить вдали от детей при температуре не выше 25 0 градусов.

Условия отпуска:
Без рецепта

Производитель: Здоровье, Украина

Инструкция препарата представлена исключительно с ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Сенадексина с целью лечения, его дозировки, схемы лечения, противопоказания и совместимостью с другими медикаментами, может предоставить только ваш лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!