

Стрептоцида линимент 5% по 30 г в тубах

Производитель

Лубныфарм, ПАО, г.Лубны, Полтавская обл., Украина

Рецепт

Продажа без рецепта

Международное название

Sulfanilamide

Код ATC

Dерматологические средства

D06Антибактериальные препараты и противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи

D06BДругие противомикробные препараты для наружного применения

D06BAСульфаниламиды

D06BA05Сульфаниламид

Фармакотерапевтическая
группа

Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Сульфаніламіди.

Регистрация

№ UA/4611/01/01 от 16.09.2011. Приказ № 596(2) от 16.09.2011

Склад лікарського засобу

діюча речовина: сульфаніламід (стрептоцид) 50 мг;

допоміжні речовини: риб'ячий жир очищений для зовнішнього застосування, бутилгідроксіанізол (Е 320), емульгатор № 1, полісрбат-80 або натрію карбоксиметилцелюлоза очищена, вода очищена;

допоміжні речовини, що входять до складу емульгатору № 1: спирт цетиловий, спирт стеариловий.

Лікарська форма

Лінімент.

Лінімент білого з жовтуватим або з жовтувато-буруватим відтінком кольору, зі специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника

БАТ «Лубнифарм».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.

Фармакотерапевтична група

Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Сульфаніламіди. Код ATC D06B A05.

Препарат виявляє антимікробний вплив на стрептококи та інші мікроорганізми. Стрептоцид порушує процес асиміляції мікробною клітиною факторів її росту – фолієвої, дигідрофолієвої кислот та інших сполук, які мають у своєму складі пара-амінобензойну кислоту (ПАБК). Завдяки схожості хімічної структури ПАБК і сульфаниламіду останній як конкурентний антагоніст кислоти включається у метаболізм мікроорганізмів і порушує його.

Показання для застосування

Виразки, опіки, тріщини, рани, піодермії, запалення бешихи та інші патологічні гнійно-запальні процеси шкіри, що супроводжуються присутністю мікроорганізмів або спричинені останніми.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату або до будь-яких інших сульфаниламідних засобів. Ниркова недостатність, гостра порфірія. Вагітність або період годування груддю.

Належні заходи безпеки при застосуванні

При появі алергічної реакції у місці нанесення мазі, слід припинити застосування препарату.

Передчасне припинення лікування препаратом може спричинити розвиток стійких до сульфаниламідів мікроорганізмів.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Не впливає.

Діти

Безпека та ефективність застосування Стрептоциду дітям не встановлені, тому не слід призначати препарат цій віковій категорії пацієнтів.

Спосіб застосування та дози

Лінімент слід наносити тонким шаром на уражену ділянку, у тому числі під марлеву пов'язку. Кратність та тривалість застосування залежить від тяжкості захворювання, досягнутого терапевтичного ефекту і визначається лікарем індивідуально.

Передозування

При передозуванні може посилюватися побічна дія препарату.

Лікування: терапія симптоматична.

Побічні ефекти

При підвищенні чутливості до сульфаниламідних засобів можливі місцеві алергічні реакції (у тому числі дерматити, крапив'янка) розвиток яких потребує негайної відміни препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Під час застосування Стрептоциду небажано приймати такі препарати як дигітоксин, кислоту хлористоводневу, кофеїн, мезатон, фенобарбітал, адреналін гідролорид.

Новокаїн, який містить залишок параамінобензойної кислоти, знижує ефективність препарату. якщо ці лікарські засоби застосовувалися відразу один за одним.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °C до 15 °C; не допускається заморожування.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Після розкриття туби препарат зберігати протягом курсу лікування.

Упаковка

По 30 г у тубах.

Категорія відпуску

Без рецепта.