

Тонзипрет

Склад.

діючі речовини: 1 таблетка містить:

Phytolacca americana Ø (лаконос американський Ø) 50 мг,

Guaiacum D3 (гваякове дерево D3) 75 мг,

Capsicum annuum D3 (перець стручковий D3) 75 мг;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, лактози моногідрат, магнію стеарат.

Лікарська форма.

Таблетки для смоктання.

Основні фізико-хімічні властивості: круглі світло-бежевого кольору таблетки плоскоциліндричної форми з фаскою.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

До складу комплексного гомеопатичного препарату входять лікарські рослини, що містять сапоніни, флавоноїди, ефірні олії. Перець стручковий містить пекучі речовини капсаїциноїди, основною складовою частиною яких є капсаїцин. Склад лікарських рослин, що є компонентами препарату, зумовлює протизапальну та аналгетичну дію лікарського засобу та зону його застосування. Лаконос американський, що входить до складу препарату, чинить також

Показання.

Гострі та хронічні запалення глотки, горла та мигдаликів (тонзиліт, ларингіт, фарингіт).

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до діючих речовин або до інших компонентів препарату. Період вагітності або годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.

На даний час відсутні відомості про будь-які взаємодії з іншими лікарськими засобами.

На ефективність гомеопатичних препаратів можуть негативно впливати нездоровий спосіб життя, застосування збуджувальних засобів.

Перед застосуванням одночасно з іншими лікарськими засобами слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості щодо застосування.

Препарат не слід приймати хворим зі спадковою непереносимістю галактози, лактазною недостатністю або глюкозо-галактозною мальабсорбцією (порушенням всмоктування).

При тривалих неясних або повторних скаргах, а також при високій температурі, що зберігається протягом довше 3 днів або піднімається вище 39 °С, слід звернутися до лікаря.

Примітка для хворих на цукровий діабет. 1 таблетка містить у середньому 0,02 хлібних одиниці.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У зв'язку з відсутністю даних не слід застосовувати препарат у період вагітності або годування груддю (див. розділ «Протипоказання»).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Особливих застережень не вимагається.

Спосіб застосування та дози.

Завжди слід застосовувати Тонзипрет® відповідно до інструкції. У разі необхідності проконсультуватися з лікарем перед застосуванням препарату.

Якщо немає особливих вказівок лікаря, препарат слід приймати так:

- Дорослі та діти віком від 12 років: 1-3 рази на добу по 1 таблетці
- Діти віком від 6 до 11 років: Не більше 2/3 дози для дорослих (максимально 2 рази на добу по 1 таблетці)
- Діти віком від 1 до 5 років: Не більше половини дози для дорослих (максимально 1 таблетку 1-2 рази на добу)

Таблетку розсмоктувати або дати їй можливість повільно розчинитись у роті. Дітям віком до 3-х років рекомендовано застосовувати Тонзипрет® у вигляді крапель.

Гомеопатичні лікарські засоби не слід приймати продовж тривалого періоду (довше 1 місяця) без консультації з лікарем.

Діти.

У зв'язку з недостатністю досвіду застосування препарат Тонзипрет® не слід призначати дітям віком до 1 року.

Передозування.

При прийомі великих доз препарату, що значно перевищують рекомендовані (100 або 200 таблеток), у пацієнтів зі спадковою непереносимістю лактози можливі шлункові розлади або діарея. Необхідно негайно промити шлунок і звернутися за допомогою до лікаря.

Побічні ефекти.

У рідкісних випадках можливе виникнення нудоти і шлункових розладів. Дуже рідко виникають алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, еритему, кропив'янку.

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове загострення існуючих скарг (первинне погіршення). У цьому випадку, а також у разі виникнення будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.

Термін придатності.

4 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці

Умови зберігання.

Зберігати для захисту від світла в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 таблеток у блістері;

по 2 блістери № 50 (25x2) або по 4 блістери № 100 (25x4) у картонній коробці.

Категорія відпустки.

Без рецепту

Виробник.

Біонорика СЕ/Bionorica SE.

Інструкція препарату Тонзипрет представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Тонзипрету з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!