

# Троксевазин

## Состав

*Действующее вещество* Троксевазина – троксерутин.

## Фармакологические свойства

Троксевазин - это капилляротонизирующее и венотонизирующее средство. Оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Троксерутин уменьшает повышенную проницаемость и ломкость капилляров и предотвращает повреждение базальной мембраны эндотелиальных клеток различными факторами, и кроме этого, имеет еще антиоксидантное, мембраностабилизирующее, антигеморрагическое, противовоспалительное, венотонизирующее действие. Уменьшает отек, улучшает трофику, улучшает микроциркуляцию и микрососудистую перфузию, и другие симптомы, связанные с венозной недостаточностью или нарушением оттока лимфатической жидкости

## Показания

- передварикозный и варикозный синдром, варикозные язвы;
- поверхностный тромбофлебит, флебит и послефлебитные состояния;
- хроническая венозная недостаточность;
- геморрой;
- в комплексной терапии диабетической ретинопатии;
- отеки и боль при травмах и варикозных венах;
- варикозный дерматит;
- комбинированное лечение контузий, растяжений, вывихов, симптомов мышечных крампы (судорожное стягивание икроножных мышц).
- Форма выпуска
- капсулы по 300 мг №50 (10x5), №100 (10x10);
- гель 2% по 20 г, 40 г или 100 г в тубах.

## Способ применения

Капсулы.

Обычная доза - 2 капсулы в сутки. Поддерживающее лечение - по 1 капсуле в сутки в течение 3-4 недель. Это лечение можно комбинировать с одновременным применением Троксевазина геля.

## Гель.

Гель наносить на пораженный участок равномерным тонким слоем утром и вечером, втирая легкими массирующими движениями до полного впитывания

препарата. Дозировка и длительность применения лекарственного средства определяет врач, учитывая тяжесть и течение заболевания.

### **Дети**

Капсулы - не применяют детям. Гель - нет противопоказаний для применения детям.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Нет данных относительно негативного влияния троксерутина на беременных и кормящих грудью, но несмотря на это, его применение в I триместре беременности не рекомендуется.

Решение о применении препарата в период беременности и кормления грудью принимает врач, только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальные риски для плода или младенца.

### **Особенности по применению**

Препарат неэффективен при отеке нижних конечностей, обусловленные заболеваниями печени, почек или сердечно-сосудистой системы.

С осторожностью назначать пациентам с тяжелыми заболеваниями печени и желчного пузыря.

Поскольку препарат может раздражать слизистую оболочку желудка, Троксевазин следует применять во время еды.

Капсулы содержат лактозу.

Риск аллергии выше у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте.

Бензалкония хлорид, входящий в состав геля, обладает раздражающим действием и может вызвать кожные реакции.

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к троксерутину или к вспомогательному веществу препарата;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит (в фазе обострения);
- троксевазин гель не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и экзематозные участки кожи.

### **Побочные эффекты**

При лечении капсулами Троксевазина редко возникают нежелательные побочные реакции: сыпь, зуд, крапивница, головокружение, головная боль, нарушение сна, боли в желудке, дискомфорт в области желудка, тошнота, рвота, метеоризм, диарея, повышенная утомляемость.

Из-за наличия красителя (E 110) лечение препаратом может вызвать аллергическую реакцию, в том числе астму.

При применении Троксевазина геля очень редко могут наблюдаться аллергические реакции, в том числе раздражение кожи, покраснение, зуд, кожная сыпь, дерматит, ангионевротический отек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия

Препарат усиливает действие аскорбиновой кислоты на укрепление структуры и уменьшению проницаемости сосудистой стенки.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами**

Не влияет.

**Передозировка**

Симптомы передозировки: усиление побочных реакций. При местном применении случаи передозировки не зарегистрированы.

Лечение. Прекратить прием препарата. Рекомендуется вызвать рвоту или сделать промывание желудка и провести симптоматическое лечение. В случае необходимости можно назначать перитонеальный диализ.

**Условия хранения**

Хранить при температуре ниже 25 ° С.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

Інструкція препарату Троксевазин представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Троксевазину з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!