

Вазелиновое масло

Фармакологическое действие

Слабительное средство. Размягчает каловые массы; оказывает слабое стимулирующее влияние на моторику тонкого кишечника.

Фармакокинетика

При приеме внутрь не всасывается.

Показания

Запор. Можно использовать как наружное средство (у детей) и как основу для различных мазей.

Режим дозирования

Внутрь, по 15-30 мл в день. Курс лечения - не более 5 дней.

Побочное действие

При длительном применении - атония кишечника, гиповитаминоз А, Е, К.

Противопоказания к применению

Гиперчувствительность, воспалительные процессы в брюшной полости, кишечное кровотечение, кишечная непроходимость, лихорадочный синдром, беременность.

Можно использовать как наружное средство (у маленьких детей) и как основу для различных мазей.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не следует назначать препарат беременным из-за возможной рефлекторной стимуляции матки.

Применение у детей

Можно использовать как наружное средство (у маленьких детей) и как основу для различных мазей.

Инструкция Вазелинового масла представлена исключительно с ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении данного препарата с целью лечения, его дозировку, схему лечения, противопоказания и совместимость с другими медикаментами, может оказать только ваш лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!