

# Верошпірон

## Опис.

Верошпірон-калійсберегаючий діуретик, антагоніст альдостерону пролонгованої дії;

Сечогінний ефект пов'язаний з тим, що через блокаду альдостерону пригнічується затримка води та іонів натрію, що сприяє утриманню іонів калію, це не тільки підвищує виведення іонів натрію і хлору, а й знижує виведення іонів калію і водню з сечею. В результаті чого препарат має також гіпотензивну дію.

Спіронолактон швидко і повністю всмоктується в шлунково-кишковому тракті, потрапляє в кров, терапевтична ефективність може зберігатися до 24 годин. Виведення головним чином відбувається нирками.

## Склад.

Діюча речовина Верошпірону - спіронолактон.

## Форма випуску.

- таблетки по 25 мг №20 в пачці картонній;
- капсули по 100 мг №30 (10x3), по 50 мг №30 (10x3) у пачці з картону.

## Показання.

- застійна серцева недостатність (в тих випадках, коли у пацієнта не настає поліпшення при лікуванні іншими діуретиками або є необхідність в потенціюванні ефектів);
- при первинному гіперальдостеронізм (синдром Кона);
- есенціальна гіпертензія (комбінована терапія);
- цироз печінки, що супроводжується асцитом і / або набряками;
- гіпокаліємія / гіпомагніємія.

## Спосіб застосування та дози.

Рекомендовано приймати добову дозу спіронолактону після їжі 1 або 2 рази на добу. Добову дозу або першу частину добової дози препарату рекомендується приймати вранці.

**Дорослі:** При есенціальнійгіпертензії добова доза становить 50-100 мг в складі комбінованої терапії. Лікування триває не менше 2 тижнів.

При гіпокаліємії добова доза 25-100 мг, максимальна добова доза 400 мг;

Верошпирон призначають при багатьох захворюваннях, таких як: цироз печінки, що супроводжується набряками або асцитом, застійна серцева недостатність, нефротичний синдром, первинний гіперальдостеронізм. Тривалість лікування, дозування препарату призначається лікарем і залежить від перебігу та тяжкості хвороби, стану хворого.

**Діти:** Початкова доза для дітей становить 1-3 мг / кг маси тіла в 1-4 прийоми. Через 5 днів дозу коректують.

Застосовувати препарат у вигляді капсул рекомендовано дітям віком від 5 років.

У разі призначення препарату дітям до 5 років слід застосовувати препарат у вигляді таблеток. Таблетку Верошпирон 25 мг необхідно подрібнити, розчинити і дати випити дитині у вигляді суспензії.

Для пацієнтів похилого віку починати лікування рекомендується з низьких доз з наступним редагуванням дозування лікарем.

### **Особливості по застосуванню.**

Верошпирон не слід приймати одночасно з алкоголем і слід уникати вживання їжі, багатої калієм.

З обережністю слід приймати Верошпирон пацієнтам з порушеннями функції нирок і печінки, із захворюванням цукрового діабету, особливо з діабетичною нефропатією, пацієнтам з порфірією.

Спіронолактон ускладнює визначення концентрації дигоксину, кортизолу та адреналіну в крові;

Капсули Верошпірону містять в складі барвник «жовтий захід» FCF (E 110), який здатний викликати алергічні реакції;

Пацієнтам з непереносимістю лактози слід з обережністю застосовувати препарат.

Дуже важливо контролювати і коригувати вміст калію у пацієнтів з тяжкою формою серцевої недостатності, які отримують спіронолактон.

Чи не рекомендовано застосовувати препарат разом з іншими калійзберігаючимі діуретиками.

### **Протипоказання.**

- підвищена чутливість до діючої речовини або будь-якого іншого з допоміжних речовин препарату;
- вагітність, період лактації;
- хвороба Аддісона;
- гіперкаліємія, гіпонатріємія;
- тяжка ниркова недостатність;
- анурія.

## **Побічні ефекти.**

Імовірність розвитку побічних реакцій залежить від дози, тривалості лікування і діляться на наступні категорії:

### **Часто виникають:**

- зниження потенції і ерекції; у жінок - порушення менструального циклу, дисменорея, аменорея, метрорагія в клімактеричному періоді, гірсутизм, болі в області молочних залоз, карцинома молочної залози (наявність зв'язку з прийомом препарату не встановлено);
- аритмії;
- нудота блювота;
- гіперкалемія;

### **Рідко виникають:**

- сонливість, сплутаність свідомості, головний біль, астенія, втома;
- діарея, загострення виразки і кровотечі шлунково-кишкового тракту, гастрит, кишкова колька, біль у животі, запор, порушення функції печінки;
- гіперчутливість;
- гіпонатріємія, дегідратація, порфірія
- висип, свербіж, кропив'янка.

## **Застосування в період вагітності або годування груддю.**

Верошпирон не призначають під час вагітності та в період годування дітей грудьми.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Керувати автомобілем і займатися видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій, на початковому етапі лікування забороняється. Час обмежень встановлюється в індивідуальному порядку пацієнтові лікарем.

## **Діти.**

Застосовують за призначенням лікаря від 5 років.

## **Передозування.**

При передозуванні може виникати сонливість, сплутаність свідомості, макулопапульозні або еритематозні висипання, нудота, блювота, запаморочення, діарея. У рідкісних випадках можлива гіпонатріємія або гіперкаліємія, особливо у пацієнтів з порушеннями функції нирок у пацієнтів з важкими захворюваннями печінки передозування може призвести до печінкової коми. Показана симптоматична терапія.

## **Умови зберігання.**

При температурі не вище 30 градусів Цельсія.

**Категорія відпуску.**

За рецептом.

**Виробник.**

ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина

Інструкція препарату Верошпірон представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Верошпірону з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!