

Зеленіна краплі

Склад: діючі речовини: настойка беладони листя, настойка конвалії трави, настойка валеріани кореневищ з коренями, ментол рацемічний;

1 мл препарату містить настойки беладони листя (*Belladonnae folia*) (1:10) (екстрагент – етанол 40 %) 0,2 мл; настойки конвалії трави (*Convallariae herba*) (1:10) (екстрагент – етанол 70 %) 0,4 мл; настойки валеріани кореневищ з коренями (*Valerianae rhizoma cum radicibus*) (1:5) (екстрагент – етанол 70 %) 0,4 мл; ментолу рацемічного 8 мг.

Лікарська форма:

Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості:

Прозора рідина зеленуватого або жовто-бурого кольору з характерним запахом.

Фармакотерапевтична група:

Комбіновані кардіологічні препарати. Код АТХ С01Е Х.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка.

Препарат чинить седативну, спазмолітичну, кардіотонічну, аналгетичну дію, зумовлені біологічно активними речовинами, які входять до складу препарату. Завдяки вмісту настойки беладони прискорює серцевий ритм.

Фармакокінетика.

Не визначалась.

Показання:

Вегетативні неврози, брадикардія.

Протипоказання:

Гіперчутливість до компонентів препарату. Органічні ураження серця і судин, глаукома, гіпертрофія передміхурової залози.

Особливі заходи безпеки:

Пацієнтам літнього віку та дітям віком від 12 років препарат застосовувати з обережністю через вміст беладони настойки (алкалоїд групи атропіну).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій:

Препарат посилює вплив седативних, снодійних засобів, нейролептиків, транквілізаторів на центральну нервову систему, кардіотоніків, аналгезуючих засобів. Зменшує дію антиаритмічних засобів, які призначають при тахікардії.

Особливості застосування:

Застосування у період вагітності або годування груддю протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами:

У період лікування препаратом слід утримуватися від керування автотранспортом та роботи з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози:

Внутрішньо дорослим застосовувати по 20-25 крапель 2-3 рази на добу, розводячи невеликою кількістю води. Дітям віком від 12 років – з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 2-3 рази на добу. Тривалість курсу лікування визначає лікар.

Діти

Не застосовувати дітям віком до 12 років.

Передозування:

Може з'явитися серцебиття, сухість у роті, порушення акомодатції, розширення зіниць, головний біль, запаморочення, загальна слабкість, нудота, тахікардія. При виявленні ознак передозування необхідно припинити застосування препарату і звернутися до лікаря з метою проведення симптоматичної терапії.

Побічні реакції:

Неврологічні розлади: психомоторне збудження, сонливість, депресія, зниження розумової та фізичної працездатності, пригнічення емоцій, головний біль, запаморочення, розлади зору.

- Кардіальні порушення: тахікардія.
- З боку шлунково-кишкового тракту: сухість у роті, спрага, нудота, блювання, діарея, запор.
- З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: м'язова слабкість.
- Алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, висипання, свербіж, набряки.

- Загальні порушення: підвищення температури тіла.

Термін придатності:

3 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Упаковка:

По 25 мл у флаконі.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Інструкція препарату представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Крапель Зеленіна з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!